

Patrones y factores subyacentes de la estructura y dinámica de bosques Mediterráneos: implicaciones teóricas y aplicadas

P. Ruiz-Benito^{1,2,3,*}

(1) Grupo de Ecología y Restauración Forestal, Departamento de Ciencias de la Vida, Unidad Docente de Ecología, Edificio de Ciencias, Universidad de Alcalá, Campus Universitario, 28805, Alcalá de Henares (Madrid), España.

(2) CIFOR-INIA. Ctra. de la Coruña, Km. 7,5. 28040. Madrid, Spain.

(3) Biological and Environmental Sciences, School of Natural Sciences, University of Stirling, FK9 4LA, Stirling, United Kingdom.

* Autor de correspondencia: P. Ruiz-Benito [paloma.ruizbenito@stir.ac.uk]

> Recibido el 19 de noviembre de 2013, aceptado el 20 de noviembre de 2013.

Ruiz-Benito, P. 2013. Patrones y factores subyacentes de la estructura y dinámica de bosques Mediterráneos: implicaciones teóricas y aplicadas. *Ecosistemas* 22(3):128-130. Doi.: 10.7818/ECOS.2013.22-3.18

Los bosques cubren más del 30 % de la biosfera, albergan cerca de dos tercios de la diversidad biológica y proporcionan múltiples servicios ecosistémicos ([Millennium Ecosystem Assessment 2005](#); [FAO 2012](#)). Sin embargo, el cambio global está causando importantes modificaciones tanto en la extensión de los ecosistemas naturales como en la cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos proporcionados ([Fig. 1](#)). Ya se han observado alteraciones en las tasas demográficas básicas de las especies arbóreas (i.e. regeneración, crecimiento, mortalidad) que podrían traducirse en alteraciones en su distribución, así como en variaciones de la cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos proporcionados por los bosques ([Fig. 2](#)). Por tanto, cuanto mayor sea nuestro conocimiento de la importancia relativa de los distintos factores que dirigen la demografía de las especies arbóreas, mayor será nuestra capacidad de inferir las implicaciones del cambio global para los ecosistemas forestales. El objetivo general de la presente tesis doctoral es analizar los factores bióticos y abióticos determinantes de procesos demográficos (i.e. regeneración, mortalidad y crecimiento; primera parte) y servicios ecosistémicos clave (i.e. productividad y almacenamiento de carbono; segunda parte) en los bosques Ibéricos, con el fin último de inferir efectos potenciales del cambio global sobre su estructura y dinámica ([Tabla 1](#)).

En la primera parte de la tesis estudié la variación de procesos demográficos (i.e. regeneración, crecimiento y mortalidad) a lo largo de gradientes bióticos y abióticos amplios, y sus efectos sobre los patrones de distribución de especies arbóreas en un contexto de cambio global usando información del segundo y tercer Inventario Forestal Español (IFN). Primero, analicé patrones de regeneración y diversidad en pinares de repoblación de la península ibérica en comparación con los patrones observados en pinares naturales, a lo largo de gradientes bióticos y abióticos ([Ruiz-Benito et al. 2012](#)). Los pinares plantados presentaron menor regeneración y diversidad que los pinares naturales, presumiblemente debido a las diferentes características estructurales encontradas. Las máximas diferencias en regeneración y diversidad entre pinares plantados y naturales ocurrieron a niveles bajos-medios de densi-

dad, de frecuencia de incendios, de precipitación y de distancia a bosques de *Quercus*. En segundo lugar, examiné la importancia relativa del tamaño del árbol, la competencia y del clima en la mortalidad arbórea para las 11 especies arbóreas más abundantes de la península ibérica ([Ruiz-Benito et al. 2013](#)). Las tasas de mortalidad se vieron positivamente afectadas por la competencia asimétrica, sobre todo en coníferas.

Consistentemente a lo largo de este primer bloque de la tesis doctoral encontré que la estructura del rodal fue un factor clave, y relativamente más importante que el clima, determinante del éxito de los diferentes procesos demográficos ([Fig. 3](#)). Además, las distintas tasas demográficas variaron en su respuesta a las características estructurales del dosel. Por ejemplo, a lo largo de un gradiente de densidad arbórea, los máximos de regeneración tuvieron lugar a niveles de densidad, y por tanto de competencia, intermedios ([Ruiz-Benito et al. 2012](#)), los de crecimiento a niveles de competencia bajos ([Gómez-Aparicio et al. 2011](#)), y los de mortalidad a niveles de competencia altos ([Ruiz-Benito et al. 2013](#)). El hecho de que la mortalidad y el crecimiento presentaran tendencias opuestas, sugiere que bajo competencia intensa las especies podrían estar funcionando en su límite fisiológico, conllevando bajos niveles de crecimiento y elevadas tasas de mortalidad ([Franklin et al. 1987](#); [Valladares y Pearcy 2002](#)).

En cuanto al clima, la importancia relativa de la temperatura como determinante de las tasas demográficas fue mayor que la de la precipitación, generalmente observando mayores tasas de mortalidad a elevadas temperaturas ([Ruiz-Benito et al. 2013](#)), lo que probablemente se debe a un mayor estrés hídrico inducido por altas temperaturas (e.g. [Carnicer et al. 2011](#)). Además, uno de los resultados más novedosos de la presente tesis doctoral es la existencia de una importante interacción entre los efectos del clima y de la estructura del rodal sobre la mortalidad ([Ruiz-Benito et al. 2013](#)). Un aumento de la aridez bajo cambio climático podría causar elevadas mortalidades ([Ruiz-Benito et al. 2013](#)) y crecimientos reducidos en los bosques de alta densidad, con serias consecuencias para la estructura de las comunidades ([Gómez-Aparicio et al.](#)

Tabla 1. Resumen de objetivos, material y métodos y resultados en forma de publicación de los capítulos de la presente tesis doctoral.

SECCIONES	OBJETIVOS	MATERIAL Y MÉTODOS			RESULTADO
		Área de estudio	Técnica estadística	Escala	
SECCIÓN 1: Factores subyacentes a procesos demográficos en bosques y patrones de distribución de especies arbóreas	Patrones de regeneración y diversidad en pinares de repoblación	Península Ibérica	<ul style="list-style-type: none"> PERMANOVA CCA (análisis de correspondencia canónico) GLM (modelos lineales generalizados) 	Parcela IFN cinco especies)	Ruiz-Benito et al. (2012) <i>Diversity and Distributions</i>
	Patrones y factores subyacentes a la mortalidad arbórea en bosques Ibéricos	Península Ibérica	<ul style="list-style-type: none"> Regresión logística parametrizada con estadística Bayesiana 	Árbol IFN (11 especies)	Ruiz-Benito et al. (2013) <i>PLoS ONE</i>
	Influencia del crecimiento y la mortalidad en la distribución de las especies arbóreas	Península Ibérica	<ul style="list-style-type: none"> Modelos de distribución de especies 	Árbol, parcela IFN (11 especies)	Benito-Garzón et al. (2013) <i>Global Ecology and Biogeography</i>
SECCIÓN 2: El papel de la diversidad, el clima y la estructura del rodal en el suministro de servicios ecosistémicos en bosques	Efectos de la diversidad funcional en el almacenamiento de carbono y productividad en bosques	Península Ibérica	<ul style="list-style-type: none"> Modelos no lineales estimados por máxima verosimilitud 	Parcelas IFN (7 tipos de bosque)	Ruiz-Benito et al. (en prensa) <i>Global Ecology and Biogeography</i>
	Factores subyacentes a los cambios en biomasa en bosques Europeos	Europa (España, Alemania, Finlandia)	<ul style="list-style-type: none"> glmm (modelos lineales mixtos generalizados) 	Parcelas IFN	Ruiz-Benito et al. (datos sin publicar)

IFN: Inventario Forestal Nacional.

Referencias

- Carnicer, J., Coll, M., Ninyerola, M., Pons, X., Sánchez, G., Peñuelas, J. 2011. Widespread crown condition decline, food web disruption, and amplified tree mortality with increased climate change-type drought. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108: 1474-1478.
- Carpenter, S.R., Mooney, H.A., Agard, J., Capistrano, D., DeFries, R.S., Díaz, S., Dietz, T., Duraipappah, A.K., Oteng-Yeboah, A., Pereira, H.M., Perrings, C., Reid, W.V., Sarukhan, J., Scholes, R.J., Whyte, A. 2009. Science for managing ecosystem services: Beyond the Millennium Ecosystem Assessment. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106: 1305-1312.
- FAO 2012. *State of the world's forests*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Roma, Italia.
- Franklin, J.F., Shugart, H.H., Harmon, M.E. 1987. Tree death as an ecological process. *Bioscience* 37: 550-556.
- Gómez-Aparicio, L., García-Valdés, R., Ruiz-Benito, P., Zavala, M.A. 2011. Disentangling the relative importance of climate, size and competition on tree growth in Iberian forests: implications for management under global change. *Global Change Biology* 17: 2400-2414.
- Millennium Ecosystem Assessment 2005. *Ecosystem and human well-being: biodiversity synthesis*. World Resources Institute. Washington D.C., Estados Unidos.
- UNEP 2008. *The Millennium Ecosystem Assessment (MA) follow-up: A global strategy for turning knowledge into action*. UNEP/CBD/COP/9/INF/26. Bonn, Alemania.
- Valladares, F., Pearcy, R.W. 2002. Drought can be more critical in the shade than in the sun: a field study of carbon gain and photo-inhibition in a Californian shrub during a dry El Niño year. *Plant, Cell and Environment* 25: 749-759.
- Vitousek, P.M. 1994. Beyond global warming: Ecology and global change. *Ecology* 75: 1861-1876.

PALOMA RUIZ-BENITO

Patrones y factores subyacentes de la estructura y dinámica de bosques Mediterráneos: implicaciones teóricas y aplicadas

Departamento de Ciencias de la Vida, Universidad de Alcalá.
Tesis Doctoral
16 Mayo 2013
Directores: Miguel A. Zavala, Lorena Gómez-Aparicio

Publicaciones resultantes de la tesis

- Benito-Garzón, M., Ruiz-Benito, P., Zavala, M.A. 2013. Inter-specific differences in tree growth and mortality responses to climate determine potential species distribution limits in Iberian forests. *Global Ecology and Biogeography* 22: 1141-1151.
- Ruiz-Benito, P., Gómez-Aparicio, L., Paquette, A., Messier, C., Kattge, J., Zavala, M.A. (en prensa) Diversity increases carbon storage and tree productivity in Iberian forests. *Global Ecology and Biogeography*. doi: 10.1111/geb.12126.
- Ruiz-Benito, P., Gómez-Aparicio L., Zavala M.A. 2012. Large scale assessment of regeneration and diversity in Mediterranean planted pine forests along ecological gradients. *Diversity and Distributions* 18: 1092-1106.
- Ruiz-Benito, P., Lines, E.R., Gómez-Aparicio, L., Zavala M.A., Coomes DA. 2013. Patterns and drivers of tree mortality in Iberian forests: climatic effects are modified by competition. *PLoS ONE* 8: e56843.