


Stephanorhinus hemitoechus (Falconer, 1859)




Los ejemplares, que fueron depositados en el Museo Arqueológico Municipal Camil Visiedo Moltó de Alcoy, proceden de unas terrazas Cuaternarias del río Barxell, con construcciones travertínicas, que descansan sobre sedimentos de facies Tap y molasas del Tortonense marino. Fueron encontrados juntos, lo que unido al similar grado de desgaste de cada diente, sugiere su pertenencia a un mismo individuo.

Yacimiento: Baradello. Alcoi (Alicante)

FILUM: Chordata. SUBFILUM: Vertebrata. SUPERCLASE: Gnathostoma.
 CLASE: Mammalia. ORDEN: Perissodactyla. SUBORDEN: Ceratomorpha.
 SUPERFAMILIA: Rhinoceroidea. FAMILIA: Rhinocerotidae.
 SUBFAMILIA: Rhinocerotinae.
 GÉNERO: Stephanorhinus KRETZOI 1942.
 Cuaternario / Pleistoceno medio-superior / pisos Tirreniense y Versiliense.



En la fotografía se observa el afloramiento de El Baradello y la flecha indica el punto exacto del hallazgo.



El rinoceronte de las praderas europeas

■ *Stephanorhinus hemitoechus* es una especie de rinoceronte que fue abundante en las praderas de Europa occidental entre hace 45.000 y 10.000 años. Era un animal bastante robusto que se alimentaba principalmente de hierba que pacía sobre el suelo. La especie fue descrita por primera vez por H. Falconer en 1859 a partir de material descubierto por él mismo en unas antiguas cuevas de Gales.

Hallazgo casual en 2003

Los restos fueron descubiertos de forma casual en el verano de 2003 por Angel Carbonell, M^a Carmen Almahano y Cristian Carbonell, miembros de la Asociación Paleontológica Alcoyana "Isurus", en la trinchera de la carretera de Alcoy a Bocairent (Km 16,2), junto a la urbanización del Baradello Gelat.