MEDITERRANEA

SERIE DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS

2011 Época II N° 22

Foto: R. Durá

COMITÉ EDITORIAL:

G.U. CARAVELLO
S.G. CONARD
A. FARINA
A. FERCHICHI
L. TAÍQUI

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias

COMITÉ CIENTÍFICO:

S. G. CONARD. USDA Forest Service. Riverside. U.S.A.
A. FARINA. Lab. Ecología del Paisaje. Museo Historia Natural. Aulla. Italia.
A. FERCHICHI. I.R.A. Medenine. Túnez.
G.U.CARAVELLO. Istituto di Igiene. Università di Padova. Italia.
L. TAÏQUI. Université Abdelmalek Essaâdi. Tetuán. Marruecos.

COMITÉ EDITORIAL:

V. Peiró, J. Martín, A.Pastor-López, E. Seva.

DIRECCIÓN:

Eduardo Seva. Dep. Ecología. Fac. de Ciencias. Universidad de Alicante.

SECRETARÍA:

Victoriano Peiró (V.peiro@ua.es). Dep. Ecología. Universidad de Alicante.

EDITA:

Servicio de Publicaciones. Universidad de Alicante.
<http://publicaciones.ua.es>

CORRESPONDENCIA:

Departamento de Ecología. Fac. de Ciencias. Universidad de Alicante.
Ap. 99 - 03080 Alicante. España.
Teléfono de Secretaría: +34965903400, ext 2255
Fax: Rev. Mediterránea. Dep. Ecología. 96/5903464

I.S.S.N.: 0210-5004

Depósito Legal: A-1059-1984

Edición electrónica:

Marten Kwinkelenberg

Notas para los autores

Los trabajos versarán sobre aspectos de ecología, recursos naturales, paisaje, gestión ambiental, en los ecosistemas de bioma mediterráneo.

Los manuscritos mecanografiados a doble espacio y por una sola cara se enviarán a la dirección del **Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante, Ap. 99 (03080 Alicante, España) —Revista Mediterránea—**. Los autores deberán enviar original y dos copias, así como en disquette compatible en programas de tratamiento de texto WORD.

LENGUA: Redactados en español, inglés, francés o italiano.

NOMBRE DE AUTORES: Apellidos y nombres sin abreviaciones.

DIRECCIÓN: Dirección profesional (Organización, Centro de Investigación, Universidad,...) teléfono, telefax, dirección electrónica.

TÍTULO: conciso y completo, sin abreviaciones (max. 60 espacios).

RESÚMEN: Después del título, un resumen en inglés y otro en francés, de 1500 espacios como máximo, independientemente de la lengua utilizada en el texto del trabajo

PARÁGRAFOS: El manuscrito debe respetar el siguiente orden: (contenido) introducción sin título, párrafos con títulos cortos (max. 50 espacios), conclusiones, agradecimientos (si procede), referencias bibliográficas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Obligatorias para las publicaciones citadas en el texto, que irán en mayúscula. Las referencias de información no publicada (informes, comunicación personal...) se incluyen en el texto entre paréntesis. La bibliografía se presentará según los modelos siguientes:

GOSZ, J.R. and SHARPE, J.H. 1989. Broad-scale concepts for interactions of climate, topography, and biota and biome transitions. *Landscape Ecology* 3:229-243.

PIANKA, E. 1986. *Ecology and natural history of desert lizards*. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.

GOLDSMITH, V. 1979. Coastal dunes. In: R.A. Davis (ed.), *Coastal sedimentary environments*. New York:Springer-Verlag.

CORRECCIÓN DE PRUEBAS: Será realizada por la redacción de la revista, aunque los autores deben enviar un texto muy claro y definitivo. Si se hallan deficiencias notorias en el texto, el trabajo será remitido a los autores de inmediato.

TABLAS: Cada tabla en página por separado, numeradas siguiendo el orden de aparición en el texto y llevarán leyenda. El método de escritura admitido puede ser WORD o EXCEL.

GRÁFICAS y DIBUJOS: Presentados en papel blanco no reciclado, exclusivamente en blanco y negro. Las láminas en color deberán ser costeadas por los autores. Gráficas y dibujos deben ser presentados de forma que, modificando su dimensión, no se vea modificada su comprensión. Deberán acompañar las leyendas al gráfico, suficientemente grandes e incluidas en la caja del mismo. Es obligatorio acompañar archivo en disco compatible y formato TIF o JPGE.

ILUSTRACIONES: Las fotografías, separadas del texto, con leyenda y número de orden, posición en el texto, etc.

NOTAS: Excepcionalmente se incluirán notas a pie, pero éstas deben ir en hojas separadas y debidamente numeradas.

EXTENSIÓN: El texto comprenderá una extensión de 5 (min.) a 25 (max.) páginas mecanografiadas. El número de gráficos, dibujos y fotografías debe ser proporcional al tamaño del texto.

La dirección de la revista se reserva el derecho de revisar los trabajos presentados con el fin de adaptarlos a la publicación.

<http://publicaciones.ua.es>

Notes for the authors

SUBJECTS

Ecology

Natural Resources

Landscape

Environmental Management

Manuscripts typed on duplicate on one side of the sheet only, should be sent to the magazine direction: **Mediterranea. S.E.B.Dep. Ecologia. Universidad de Alicante. Ap. 99 (03080 Alicante) Spain.** All authors are kindly requested to send their papers in writing, but namely on MS DOS/ IBM compatible disks, using WORD program. Every paper should conform to the following rules:

LANGUAGE: Spanish, English, French or Italian.

NAME OF THE AUTHORS: Preceded by the full first name without abbreviations.

ADDRESS: Institutional address of author(s) (Institutions, Research Centre, University), telephone, fax, electronic adress..

TITLE: Concise but detailed enough, without abbreviations (max. 60 strokes).

ABSTRACTS: In English and French, whatever it might be the language of the paper. The lenght should not exceed 1500 strokes.

PARAGRAPHS: Should be arranged as follows: (contents) introduction without title, paragraphs with short titles (max. 50 strokes), conclusions, acknowledgments (if required), references.

REFERENCES: Should include only publications mentioned in the text. References to unpublished informations (reports, personal communications, etc.) should be included between parentheses in the text. The bibliography should be presented in conformity with the following patterns: GOSZ, J.R. and SHARPE, J.H. 1989. Broad-scale concepts for interac-

tions of climate, topography, and biota and biome transitions. *Landscape Ecology* 3:229-243.

PIANKA, E. 1986. *Ecology and natural history of desert lizards*. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.

GOLDSMITH, V. 1979. Coastal dunes. In: R.A. Davis (ed.), *Coastal sedimentary environments*. New York:Springer-Verlag.

CORRECTIONS TO THE PROOF: Will be done by the editorial staff. Authors are kindly requested to submit a clear and final paper.

TABLES: Each table should be on a separate sheet, numbered consecutively, with a legend. The writing method admitted is WORD, EXCEL..

GRAPHICS AND DRAWINGS: Separated from the text, should be lettered on white or glossy paper, in black and white in compatible disks TIF or JPGE format. They should be clearly "constructed", with sufficiently big letters within the block of the graph.

ILLUSTRATIONS: Photographs should be numbered and lettered.

NOTES: They should be numbered and referred to in the text. They should be compiled on separate sheets.

LENGHT: Preferably between 5 (min.) and 25 (max.) typed pages. The number of illustrations, tables and graphs should be proportional to the lenght of the text.

The articles are reviewed by the editorial staff to be conformed for their publication.

<http://publicaciones.ua.es>

La ecología del paisaje es una rama reciente de la ecología que ofrece teoría y métodos para explicar las dinámicas ecológicas de grandes áreas y abre nuevas perspectivas sobre los problemas relacionados con la gestión de los ecosistemas y la planificación del uso del territorio. La atención de la ecología del paisaje se centra en la identificación de las causas y las consecuencias de la heterogeneidad espacial, que es fruto de complejas interacciones entre la biota y el ambiente, además de en la actividad humana que ha contribuido desde tiempos prehistóricos a los cambios del paisaje y es responsable actualmente de profundas y repentinas alteraciones. El punto de vista de la ecología del paisaje integra el contexto natural con el contexto humano y centra su atención en lo que Almo Farina denomina “el

mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos antrópicos. Los ambientes influidos por el hombre han sido durante largo tiempo cosecha ignorada por los ecólogos porque resultaban poco atractivos desde el punto de vista naturalista; sin embargo son precisamente los “paisajes culturales” (es decir, áreas moderadamente modificadas por el hombre que comprenden elementos naturales) los que proporcionan la clave para la comprensión de los procesos que llevan a la integración entre las realidades naturales y la realidad humana.

Almo Farina está profundamente convencido de que el conocimiento de los procesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los ambientes modificados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emergen de los sistemas naturales.

La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de integración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confiere al autor de este texto una carga de entusiasmo que se traduce en una presentación apasionante de la disciplina. Al interés intrínseco de los argumentos cabe añadir: a) la simplicidad del lenguaje específico que facilita la comprensión; b) una serie de ejemplos de muchas de ellas referidas a los ambientes montañosos de los Apeninos donde el autor ha realizado gran parte de sus investigaciones) que esclarecen el corpus doctrinal presentado pero que, en definitiva, son puramente mediterráneos; c) la continua referencia a los argumentos relacionados y a sus aplicaciones.

Una excelente publicación de ecología espacial de la Universidad de Alicante

**SARI-ALI, A.; BENABADJI, N.;
GHEZLAOUI, B-E.; BOUAZZA, M.**

**Aspects physiologiques de la végétation
halo résistante et halophile du Nord et du
Sud de l'Algérie occidentale**

Portada

Créditos

Résumé	213
Summary	214
Introduction.....	216
Situation géographique et choix des stations	218
Zone nord.....	218
Zone sud	221
Aperçu bioclimatique.....	223
Aperçu pédologique.....	224
Zone nord.....	225
Zone sud	226
Matériels et méthodes	226
Etude Cartographique.....	226
Résultats et interprétations.....	229
Zone nord.....	229
Zone sud	232
Conclusion.....	241
Bibliographie.....	243
Notas	250

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

SARI-ALI, A. (1); BENABADJI, N. (1); GHEZLAOUI, B-E. (1);
BOUAZZA, M. (1)

Résumé

On se propose, à travers cette étude de cartographier la végétation halo résistante et halophile de deux zones de l'Algérie occidentale l'une au Nord (région de Hammam Bouhrara) et l'autre au Sud (région du Chott El-Gharbi). Une comparaison de ces deux zones d'un point de vue physiologique a été menée, afin de mettre en évidence la diversité phytécologique de ces peuplements. Les données bioclimatiques montrent que les zones d'étude sont toutes deux caractérisées par une longue période de sécheresse estivale variant de 6 à 7 mois. D'un autre côté, l'approche édaphique montre

une texture limono-sableuse à sableuse aussi bien au Nord qu'au Sud. Par contre la salinité est nettement plus accentuée au Sud atteignant 1350 μ .S/cm. La carte physionomique de la végétation de la zone nord fait apparaître la dominance de formations pures à *Tamarix gallica* L. (27,13%) ou à *Atriplex halimus* L. (37,99%), et de formations en mosaïques, où les deux genres se trouvent mêlés (16,87%). Au niveau de la zone sud deux grandes unités physionomiques se distinguent: les groupements à *Salsola vermiculata* L. (24 %) et les groupements à *Lygeum spartum* L. (6 %). Les groupements à *Artemisia herba-alba* Asso. occupent par contre de petites surfaces (2 %) de qualité moyenne à médiocre. Les peuplements à *Arthrocnemum glaucum* (Del.) Ung. quant à eux, se répartissent tout autour de la daya du Chott El-Gharbi, où la salinité est à son maximum, en constituant un tapis végétal assez dense (1 %).

Mots clés: Cartographie végétale, Végétation halophile, Hammam-Boughrara, Chott El-Gharbi, Oranie (Algérie).

Summary

We propose, through this study, to chart the halophilous and halation resistant vegetation of two zones of Western Algeria one in North (area of Hammam Boughrara) and the other in

the South (area of Chott El-Gharbi). A comparison of these two zones from a physiognomical point of view was carried out, in order to highlight the phyto ecological diversity of these settlements. The bioclimatic data shows that the zones of study are both characterized by one long period of estival dryness varying from 6 to 7 months. The pedological approach shows a limono-sand to sand texture as well in North as in South. On the other hand, salinity is definitely accentuated in the South, reaching 1350 $\mu\text{S}/\text{cm}$. The physiognomical map of the northern area vegetation reveals the predominance of pure formations of *Tamarix gallica* L. (27, 13%) or of *Atriplex halimus* L. (37, 99%), and of mosaic formations where the two kinds are mixed (16, 87%). In the southern area two great physiognomical units are distinguished: *Salsola vermiculata* L. groups (24 %) and *Lygeum spartum* L. groups (6 %). *Artemisia herba-alba* Asso. groups occupy small surfaces (2 %) of average quality to poor. Settlements of *Arthrocnemum glaucum* (Del.) Ung. are distributed all around the daya of Chott El-Gharbi, where salinity is at its maximum, by constituting a rather dense vegetal carpet (1%).

Key words: Vegetation map work, Halophilous vegetation, Hammam-Boughrara, Chott El-Gharbi (chott=salt lake), Oranian area (Algeria).

Introduction

Les terrains halomorphes ou salsodiques, plus communément connus sous le terme de terrains salés, se rencontrent dans toutes les parties du monde et particulièrement en Afrique du nord. Ils sont fréquents au Maghreb, aussi bien en situation littorale que continentale (Chotts, Sebkhass).

Leur extension est favorisée par les irrégularités du climat méditerranéen, les influences de l'aridité saharienne (Boulaine, 1957) et par la remontée de la nappe aquifère sous l'influence de pratiques agricoles (Servant, 1970 et 1975). Les eaux d'irrigation souvent de qualité médiocre, le drainage déficient ainsi que les irrigations non contrôlées sont autant de facteurs contribuant à l'installation de la salinité des sols (Chevery et Robert, 1993).

La richesse de ces sols en sels solubles ou en ions défloculants tels que le sodium se répercute dans leur morphologie, en surface et plus ou moins en profondeur. Dès que la salinité atteint un certain seuil, celle-ci provoque la dégradation des propriétés physiques du sol (notamment la structure), des propriétés chimiques et bioclimatiques (toxicité de certains éléments tels que le chlore et le sodium) ainsi que le ralentissement de l'activité biologique (De Boodt, 1993; Chevery et

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

Robert, 1993). La surface des sols sodiques est parfois recouverte d'une véritable croûte saline; ce phénomène a déjà été décrit il y a bien longtemps par Durand (1958).

En parallèle avec ces changements édaphiques, des changements importants se manifestent au niveau de la végétation. De ce fait, toute modification du milieu est suivie par une réaction immédiate de la végétation dont la sensibilité et la fragilité sont très accusées (Bendaanoun, 1981). Certains groupements disparaissent pour céder leur place à d'autres plus adaptés, il s'agit des peuplements halophiles.

Ces peuplements ont fait l'objet en effet de nombreux travaux en Oranie, on citera quelques uns d'entre eux: Killian (1954), Ruellan (1971), Halitim (1973, 1988), Boukhris et Lossaint (1975), Pouget (1973, 1980), Alcaraz (1982), Djebaili (1984), Aimé (1991), Benabadji (1991, 1995), Bouazza (1991, 1995), Adi (2001), Aboura (2006), Merzouk (2009), Ghezlaoui (2011).

Bemoussat (2004) a réalisée une cartographie des peuplements halophiles, à l'aide de plusieurs placettes appelées fenêtres, le long des deux rives de l'oued Tafna, afin de nous éclairer sur l'organisation, les associations et l'importance de ces formations végétales. Aboura et *al.* (2007) a comparé plus précisément les Atriplexaies du Nord et du Sud de l'Oranie en faisant appel à trois variantes écologiques: bioclimat,

sol et végétation. Aussi, ce travail apporte une contribution à l'étude des peuplements halophiles de l'Oranie à travers leur cartographie, au niveau de deux zones d'étude l'une située au Nord à proximité de Maghnia et l'autre plus au Sud au niveau du Chott El-Gharbi.

Ces deux zones présentent-elles des différences au niveau phyto écologique d'une part et au niveau physionomique d'autre part? Afin de pouvoir apporter des éléments de réponses, nous avons été amenés à effectuer une étude comparative entre les peuplements halophiles du Nord et du Sud.

Situation géographique et choix des stations (Figure 1)

Zone nord (Photo 1 et 1')

Cette région d'étude se situe en Algérie occidentale et est partagée administrativement entre les Wilayas de Tlemcen et Ain Temouchent. Elle est limitée naturellement par les monts des Traras au Nord-Ouest et les monts de Tlemcen au Sud. Hammam Boughrara (commune de la région d'étude) est limitée administrativement:

- A l'Ouest par les communes de Maghnia et Djabala,
- Au Sud par les communes de Remchi et Sabra,
- A l'Est par les communes de Hennaya et Tlemcen,
- Et au Nord par celles de Zenata et Remchi.

Aspects physionomiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

Figure 1: Situation Géographique des Zones d'Etude

Photo 1 : Touffes d'*Atriplex halimus* L. très denses à droite et *Tamarix gallica* L. à gauche (Zone nord).

L'espace, retenu pour la réalisation de cette cartographie physiologique, correspond aux surfaces situées, de part et d'autre de l'Oued Tafna et sur les piémonts des montagnes avoisinantes; il longe aussi la route nationale Zenata-Hammam Boughrara-Maghnia. Le territoire cartographié représente une superficie de 382,86 ha sur une tranche altitudinale variant entre 222 et 285 mètres. Il s'allonge entre 0°40 et 1°50 de longitude Ouest et 35°10 et 35°80 de latitude Nord.

Aspects physionomiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

Photo 1': Les deux versants de la station sont dominés par *Atriplex halimus* L. et *Tamarix gallica* L. le long de l'oued Tafna (Zone nord)

Zone sud (Photo 2)

Cette région d'étude se trouve à proximité de la frontière algéro-marocaine, entre 34° et 34°40' de latitude nord et 0° 30' et 2°30' de longitude ouest. Celle-ci fait partie d'un secteur appelé «hautes plaines steppiques», ensemble qui s'élève à une altitude d'environ 1100 à 1200m qui s'oppose d'une façon nette par son aridité et la monotonie de ses paysages, à la zone nord.

Photo 2: Peuplements à *Arthrocnemum glaucum* (Del.) Ung. au niveau de la daya du Chott El-Gharbi (Zone sud)

La zone cartographiée est traversée du Nord vers le Sud par la route nationale 22 reliant Tlemcen à Bechar en passant à proximité du Chott El-Gharbi (agglomération d'El-Kasdir) et de l'Ouest vers l'Est par le chemin de wilaya reliant Abdelmoula à Oglat Marhboura (frontière marocaine). Elle englobe la daya du Chott El-Gharbi qui correspond au point le plus bas de la région soit 967m.

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

Aperçu bioclimatique (Figure 2)

Sur le plan climatique, les zones d'étude sont caractérisées à partir de séries de données de 1980 à 2000 pour la zone nord et de 1998 à 2007 pour la zone sud (P en mm et T en °C), fournies par les stations météorologiques situées dans la région notamment Maghnia et El Aricha. Selon la classification thermique de Debrach (1953), nous avons deux types

Figure 2 : Climagramme pluviothermique d'Emberger

1 – Station de « Maghnia »

2 – Station de « El Aricha »

Nouvelle période (1980 à 2000)

Nouvelle période (1998 à 2007)

de climat à savoir, semi continental pour la station Maghnia (34,83) et continental pour la station d'El-Aricha (36). Le quotient d'Emberger (1955) est spécifique du climat méditerranéen, il est le plus fréquemment utilisé en Afrique du Nord car reflétant l'aridité du climat. La zone nord a le Q2 le plus élevé avec 28,23 alors que la zone sud a un Q2 de 18,51. Les Q2 ont été calculés selon la formule suivante:

$$Q2 = \frac{2000 P}{M^2 - m^2} \quad \text{avec «M» et «m» en } ^\circ K \text{ et «P» en mm}$$

Selon le climagramme d'Emberger les stations des deux zones appartiennent à deux étages bioclimatiques différents soit aride supérieur à hiver frais pour la zone nord soit aride inférieur à variante hivernale froide pour la zone sud. Les zones d'étude sont toutes deux caractérisées par une longue période de sécheresse estivale variant de 6 à 7 mois favorisant l'installation d'une végétation xérophile voire halophile dans les cas extrêmes.

Aperçu pédologique

Les sols des milieux arides et salés ont été décrits et étudiés par de nombreux auteurs: Durand (1958), Ruellan (1971), Pouget (1980), Aimé (1991), Benabadji et *al.* (1996), Merzouk (2010).

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

Les sels au sens large du terme, constituent les traits caractéristiques des paysages arides d'Algérie, plus de 95% des sols de ces régions sont en effet soit calcaires soit gypseux soit salsodiques (Halitim, 1988).

Zone nord

Les résultats analytiques obtenus (Sari-Ali, 2004) sur quelques échantillons de sol prélevés dans la zone d'étude montrent:

- Une texture limono-sableuse à sableuse,
- des teneurs en CaCO_3 supérieures à 25%,
- Un pH constamment basique. On enregistre des valeurs supérieures à 8,7 dans tous les prélèvements effectués,
- Une salinité (conductivité électrique) très variable allant du peu salé au salé. Elle est à son maximum tout le long de l'oued Tafna avec 1,21 mS/cm. Ces sels sont essentiellement des chlorures, le NaCl étant l'élément le plus dominant,
- Un taux de matière organique relativement faible pour l'ensemble de la zone qui varie de 1,06 % à 2,21%.

Zone sud

Les sols de cette zone sont dits sodiques; ils sont caractérisés le plus souvent par une texture limono-sableuse; le pH est toujours alcalin (>8) malgré des teneurs en CaCO_3 très faible. La teneur en matière organique est faible, elle ne dépasse pas 1,2%, ceci est probablement lié à la faible couverture végétale de la zone étudiée. La salinité est très élevée dans cette zone, elle peut atteindre 1350 $\mu\text{S}/\text{cm}$. La salure des sols peut varier quantitativement et qualitativement en fonction de la dynamique des nappes saumâtres imposées par les conditions géomorphologiques et climatiques. Le sol en saison sèche présente des lamelles peu épaisses plus ou moins dures. On peut également observer en surface des efflorescences cristallines blanches ou grises tout autour du lit de la Daya ceinturée par des peuplements à *Arthrocnemum glaucum* et à *Salicornia fruticosa*.

Matériels et méthodes

Etude Cartographique

Le document cartographié doit être simple et un allègement important consiste à limiter la partie traditionnelle réservée aux descriptions des parcelles. Après avoir délimité des aires physionomiquement homogènes, grâce aux photographies

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

aériennes et aux missions successives effectuées sur le terrain, les différents types de formation végétale et d'occupation du sol ont été relevés au niveau des deux zones d'étude afin de mettre en évidence l'état actuel de la végétation. Établies durant les années 2003-2004-2005, ces cartes comprennent les types physiologiques des formations végétales halophiles, représentés en peuplements denses, moyennement denses ou clairsemés et en peuplements associés (en mosaïques).

Cette cartographie des formations végétales en fonction de leur densité, identifiées par la ou les espèces dominantes, s'est basée sur la hiérarchie suivante:

(1) = peuplement dense (2) = peuplement moyennement dense
(3) = peuplement clairsemé

Pour la carte 1:

- At-1: Peuplement à *Atriplex halimus* dense,
- At-2: Peuplement à *Atriplex halimus* moyennement dense,
- At-3: Peuplement à *Atriplex halimus* clairsemé,
- Ta-1: Peuplement à *Tamarix gallica* dense,
- Ta-2: Peuplement à *Tamarix gallica* moyennement dense,
- Ta-3: Peuplement à *Tamarix gallica* clairsemé,
- Mosaïques à *Atriplex halimus* et *Tamarix gallica*,

- (At+Ta)-1: Peuplement dense,
- (At+Ta)-2: Peuplement moyennement dense,
- (At+Ta)-3: Peuplement clairsemé,
- O1: Peuplement à *Olea europea*,
- Cy: Peuplement à *Calycotome spinosa*,
- Jc: Peuplement à *Juncus maritimus*,
- Nr: Peuplement à *Nerium oleander*,
- P: Pelouses,
- C: Cultures,
- Sn: Sol nu.

Pour la carte 2:

- Ar-1: Peuplement à *Artemisia herba alba* dense,
- Ar-2: Peuplement à *Artemisia herba alba* moyennement dense,
- Ar-3: Peuplement à *Artemisia herba alba* clairsemé,
- Ly-1: Peuplement à *Lygeum spartum* dense,
- Ly-2: Peuplement à *Lygeum spartum* moyennement dense,
- Ly-3: Peuplement à *Lygeum spartum* clairsemé,
- Sa-1: Peuplement à *Salsola vermiculata* dense,
- Sa-2: Peuplement à *Salsola vermiculata* moyennement dense,
- Sa-3: Peuplement à *Salsola vermiculata* clairsemé,
- Ar-1: Peuplement à *Arthrocnemum glaucum* dense,

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

- At-1: Peuplement à *Atriplex halimus* dense,
- At-2: Peuplement à *Atriplex halimus* moyennement dense,
- C: Cultures,
- S: Sol nu.

Afin de faciliter la lecture, des trames ont été adoptées pour la réalisation des documents cartographiques.

Nous avons également procédé à l'évaluation des surfaces cartographiées que nous avons exprimées en %.

Résultats et interprétations

Zone nord (Figures 3 et 4)

La plus grande surface est occupée par le peuplement à *Tamarix gallica* moyennement dense avec 19,33%; On le retrouve d'amont en aval sur les bords directs de l'oued Tafna, sur des pentes faibles variant de 5 à 10 %.

Les peuplements à *Tamarix gallica* dense et clairsemés sont faiblement représentés avec respectivement 1,54% et 6,26%.

L'*Atriplex* est présent sous trois formes : dense avec 16,66%, moyennement dense avec 13,33% et clairsemés avec 8%. Ce qui nous fait un total non négligeable de 37,99%. On le retrouve sur la rive gauche de l'oued sur des terrains à topographie presque plate (– 5% à 10%). Au niveau de la rive droite,

Figure 3 : Carte physionomique de la végétation
"Hamam Boughrara"

les pentes varient de 10 à 30%, l'espèce est présente mais son taux de recouvrement diminue.

Concernant les formations mêlées ou en mosaïques à *Atriplex halimus* et *Tamarix gallica*, nous avons:

- Peuplement dense avec 7,67%,
- Peuplement moyennement dense avec 6,6%,
- Peuplement clairsemé avec 2,6%.

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

Figure 4: Occupation du sol en pourcentage de la région de Hammam Bouhrara cartographiée.

Le reste des formations végétales correspond à des vestiges pré forestiers représentés par: *Olea europea*, *Calycotome spinosa*.

Au niveau de la région d'étude les peuplements à *Juncus maritimus* sont restreints (0,07%) et situés exclusivement en amont de l'oued Tafna.

Les cultures irriguées occupent 8,33% de la surface totale cartographiée. Ces surfaces tendent à augmenter vu la faible

distance qui les sépare de l'oued Tafna. De plus le défrichement s'effectue souvent au profit de ces cultures vivrières pratiquées par les agriculteurs des agglomérations avoisinantes.

Les sols nus et les pelouses sont plus en retrait par rapport à l'oued Tafna et sont représentés par des pourcentages réduits, soit 2,47 et 2,3%.

Zone sud (Figures 5 et 6)

Au fur et à mesure que l'on s'approche d'El-Kasdir (Chott El-Gharbi), les formations végétales des milieux salés dominent incontestablement le paysage.

D'une manière générale deux grandes unités physionomiques se discriminent bien dans l'espace en fonction de la situation topographique:

- les groupements à *Salsola vermiculata* (24%) comprenant entre autres les espèces suivantes: *Salsola longifolia*, *Noaea mucronata*, *Salicornia fruticosa*, *Atriplex dimorphostegia*, *Peganum harmala*, *Halogeton sativus*, *Pseudocytisus integrifolius*, *Astragalus pentaglottis*...
- les groupements à *Lygeum spartum* (6%) comprenant *Atractylis cancellata*, *Astragalus scorpioides*, *Plantago albicans*, *Ziziphus lotus*, *Noaea mucronata*...

Aspects physionomiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

Figure 5 : Carte physionomique de la végétation du Chott El - Gharbi

Salsola vermiculata et *Lygeum spartum* s'installent dans les parties les plus basses des dépressions où les mécanismes d'évaporation favorisent le développement d'efflorescences de gypse et de nitrates (Benabadji, 1999).

Au niveau de la rive gauche du tronçon de l'axe routier El Kasdir-El Aricha, Sebdou, juste à la limite de notre zone d'étude se trouvent les groupements à *Artemisia herba alba*. Ces derniers occupent de petites surfaces (2%) de qualité moyenne

Figure 6 : Occupation du sol en pourcentage du Chott El – Gharbi cartographiée

à médiocre; ceci est dû à l'impact d'une agriculture céréalière qui demeure peu performante.

Les groupements à *Arthrocnemum glaucum* se répartissent tout autour de la daya, là où la salinité est à son maximum, en constituant un tapis dense, leur taux d'occupation par rapport à la surface d'étude reste très faible soit 1%. Ce groupement est souvent très pauvre floristiquement voire monospécifique avec *Halocnemum strobilaceum* comme espèce vedette.

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

Cette dernière est connue comme la phanérogame supportant les plus forts taux de salure à l'échelle de la planète et c'est souvent la seule à pouvoir s'aventurer à l'intérieur de la daya où même *Arthrocnemum glaucum* ne peut s'y implanter.

Au niveau de Oglat Labta se trouve un autre groupement végétal à *Atriplex halimus* (3%) constitué de *Frankenia thymifolia*, *Atriplex dimorphostegia*, *Dactylis glomerata*, *Polygonum salicifolium*, *Hordeum maritimum*, *Tamarix gallica*.

Les surfaces occupées par les cultures (11%) envahissent progressivement la zone et témoignent de la pression anthropozoogène qui s'y exerce.

De plus selon les figures 6 et 7 le pourcentage attribué au sol nu (866,56 km² soit 53%) demeure impressionnant par rapport au reste des surfaces occupées par les différents groupements végétaux et les cultures. En effet dans cette zone sud le taux de recouvrement ne dépasse pas les 15%.

La végétation des sols salés oranais a été étudiée par Simonneau (1952), Dubuis et Simonneau (1957, 1960), Quézel et Simonneau (1960), sa répartition est liée à la salinité du sol. Les plantes dominantes sont le plus souvent des salsolacées annuelles ou vivaces qui forment soit des peuplements purs, soit des associations comparables à celles décrites pour

Figure 7: Mise en évidence du pourcentage de sol nu dans la région d'étude (Chott El-Gharbi)

le sud de la France (Braun Blanquet, 1952; Dubost, 1966). Chaque groupement reflète des conditions écologiques précises.

Les cartes de la zone nord et sud montrent toutes deux que l'évolution de la végétation dans le temps et l'espace peut résulter de deux facteurs fondamentaux, il s'agit notamment de l'activité anthropozoogène et des conditions climatiques.

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

Les cultures et le défrichement semblent prendre de plus en plus d'ampleur (augmentation de 1% par an) (Bouazza et *al.*, 2004).

Au Nord dans la région de Hammam Boughrara, en fonction des gradients de variabilité écologique (salinité, humidité, topographie...) la végétation se répartie essentiellement soit:

- Sous forme de ceintures ou bandes constituées par une seule espèce, parallèles aux rives de l'oued Tafna. Dans les écosystèmes sélectifs, la végétation se répartit en ceintures, ce qui reflète la dominance d'un ou deux facteurs écologiques, comme l'a bien souligné Bendaanoun (1981) dans ses travaux sur l'Oued Bou-Regreg (Maroc),
- Sous forme de mosaïque, soit la juxtaposition de divers peuplement dans une même placette. Cette structure en somme traduit l'interaction de plusieurs variables écologiques.

Aussi la présence de peuplements monospécifiques tels que *Atriplex halimus* ou *Tamarix gallica* peut être révélatrice ou indicatrice du milieu ambiant. En effet, Bendaanoun (1991) décrit le *Tamarix* comme étant très abondant surtout sur le littoral méditerranéen dans les lits d'Oued et ceci en raison des taux d'humidité et de salinité souvent croissants. Sa présence

semble être liée au dessablement de l'horizon superficiel par les eaux de pluies ce qui peut mettre en évidence la faible salinité observée à la surface du sol à texture moyenne et conditionner ainsi la fraction limoneuse favorable à la pénétration d'eau douce (Bemoussat, 2004).

Les vallées, les dépressions, les sebkhas et chotts et les marges sahariennes sont susceptibles de développer une végétation à caractère halophile en l'occurrence *Atriplex halimus* également présent en zone sud.

Son taux de recouvrement diminue au fur et à mesure que la pente augmente et que les dépôts d'érosion s'amenuisent. Cette chénopodiacée vivace apparaît également sur les lignes d'épandage et sa régénération est entravée lorsque la pente dépasse généralement les 15% (Bemoussat, 2004; Sari-Ali, 2004).

La végétation en mosaïques induit une véritable imbrication des peuplements à *Tamarix* et *Atriplex* qui présentent des affinités écologiques différentes pouvant rendre leur interprétation souvent délicate.

Le couvert végétal configuré sur la carte de la zone sud comprend une végétation plus spécialisée à base d'halophytes capables de tolérer des teneurs très élevées en sels comme

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

Salicornia fruticosa, *Arthrocnemum glaucum*, *Halocnemum strobilaceum*, *Salsola vermiculata* ou moyennement élevées comme *Atriplex halimus*, *Lygeum spartum* ou *Tamarix gallica*; ceci n'exclut guère la présence d'autres espèces annuelles et vivaces accompagnatrices de ces cortèges floristiques. Ces steppes en équilibre avec le climat local, jouent un rôle de zone tampon entre la zone saharienne à l'extrême Sud et la frange littorale au Nord.

Cependant, les différentes interventions de l'homme et de ses troupeaux ont contribué à modifier massivement la répartition de ces espèces. Les territoires steppiques du Chott El- Gharbi au sud de Sebdou semblent avoir amorcé le processus de désertification (Bouazza et *al.*, 2004). Les steppes à *Artemisia herba-alba* laissent la place à des formations basses herbacées constituées de nitratoxytes et théroxytes. Les steppes à *Salsola vermiculata* cèdent aussi la place à des espèces épineuses ou toxiques telles que *Noaea mucronata*, *Atractylis cancellata* ou *Peganum harmala* (Benabadji et Bouazza, 2002).

Quant aux milieux (nord et sud) où l'agriculture est pratiquée, souvent les façons culturales sont inadaptées, voire archaïques et ne ménagent nullement le sol (érosion très sévère). L'érosion, dont le paramètre topographique est fonda-

mental pour expliquer l'importance des phénomènes érosifs, est toujours présente, qu'ils s'agissent de plaines, de plateaux ou de versants à pentes forte (+25%) ou faible (0 à 10%). De plus l'accroissement des processus anthropiques (déforestation, surpâturage et activités riveraines) représente un facteur majeur de dégradation du sol et de la végétation halophile (Benabadji et Bouazza, 2000). Aussi, en zone nord, le défrichement se fait souvent au profit des cultures sous serre et prend de plus en plus d'ampleur. L'orientation serait plutôt vers un système de culture plus adapté soit une reconversion progressive des cultures vivrières en plantation arboricole en recourant surtout aux espèces rustiques et le maintien d'une activité agro-pastorale contrôlée (Haddouche et *al.*, 2008). Au Sud, les parcelles agricoles sont implantées sur des sols déjà fragilisés. Selon Benabadji et *al.* (2007) la mise en culture de sols sableux sensibles à l'érosion dans des zones fragiles où la déflation éolienne est très active réduit la couche fertile des sols.

Les vestiges pré-forestiers quant à eux, présents exclusivement en zone nord et très en retrait par rapport aux rives de l'oued Tafna, sont nettement moins soumis à l'érosion mais restent néanmoins victimes du surpâturage.

Conclusion

Cette cartographie de la végétation nous a permis de réaliser à la fois un inventaire réel (aspect physionomique des formations végétales) et un inventaire potentiel (aspect dynamique des séries de végétation). Demeurant un instrument d'une valeur indéniable, ces cartes de végétation semblent exprimer le mode d'organisation des différentes communautés végétales relevées. Elles peuvent aussi devenir en biogéographie et en écologie de la conservation un moyen d'interpréter le milieu naturel et prévoir son évolution (Ozenda, 1986). Ces cartes physionomiques de la végétation élaborées orienteront l'aménagement des terres. Néanmoins, cette première approche a permis seulement d'identifier les principales formations végétales en fonction des facteurs qui ont été pris en considération et il appartient dès lors à l'aménagiste de compléter cette étude par une analyse plus fine sur le terrain en fonction des orientations qu'il souhaite projeter.

La végétation halophile et halo résistante de l'Oranie occidentale en général et dans nos régions (Hammam Boughrara et Chott El-Gharbi) en particulier est riche de sa diversité floristique et syntaxonomique (12 peuplements) sans offrir un endémisme particulièrement développé; l'écodiversité de la flore est liée à la variation de nombreux facteurs écologiques

d'une part, et à leur combinaison d'autre part. On retiendra ainsi les critères fondamentaux suivants: le gradient pluviométrique décroissant du Nord vers le Sud, l'hétérogénéité du substrat, le taux de salure des sols (1,21 mS/cm à 1,35 mS/cm) et la présence de nappe phréatique. Néanmoins, cette végétation spécialisée est particulièrement perturbée par les actions d'origine anthropozoogène. On constate aujourd'hui qu'aux taxons hygrophiles ou xérophiles, halophiles ou glyco-philés, psammophiles ou indifférents à la dominance du sable dans le sol, se substituent en de nombreux points une flore dominée par des espèces nitrophiles ou subnitrophiles. Tant que la pression de celles-ci reste légère, elles représentent quand même un facteur d'enrichissement et donc d'augmentation de la biodiversité. Mais la dynamique actuelle laisse craindre à terme une banalisation des biotopes et de leur flore, les espèces liées aux perturbations (*Pseudocytisus integrifolius*, *Peganum harmala* etc.) tendant à éliminer les autres (Chaabane, 1993). Nous avons également constaté que le taux d'occupation des sols nus en zone sud (53%) est nettement plus important qu'en zone nord (2,47%) ce qui laisse paraître une amorce de désertification inquiétante.

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

Bibliographie

- ABOURA, R. 2006. Comparaison phyto-écologique des Atriplexaies situées au Nord et au Sud de Tlemcen. Mém. Mag. Univ. Tlemcen. 187p.
- ABOURA, R. BENMANSOUR, D. BENABADJI, N. 2007. Comparaison et phytoécologie des Atriplexaies en Oranie (Algérie). *Ecol. Med.*, 32: 73-84.
- ADI, N. 2001. Contribution à l'étude des formations à *Salsola vermiculata* le long d'un gradient de salinité dans la région du Chott Chergui (Sud Oranais). Mém. Mag. Univ. Alger, 118p.
- AIME, S. 1991. Etude écologique de la transition entre les bioclimats sub-humide, semi-aride et aride dans l'étage thermo méditerranéen du Tell oranais (Algérie Nord-occidentale). Thèse Doct. Sci. Univ. Aix-Marseille III, 200p. + annexes.
- ALCARAZ, C. 1982. La végétation de l'Ouest algérien, 3 vols.: Vol. 1: 415p. Vol. 2: 24 grap. et tabl. + 13 cartes dont 1 carte au 1/500 000 en couleur, Vol. 3: 116p. Tabl. Phyto. Thèse Doct. d'État, Univ. Perpignan.
- BEMMOUSSAT, Fz. 2004. Relations bioclimatiques et physiologiques des peuplements halophytes. Mém. Mag. Univ. Tlemcen. 161p.
- BENABADJI, N. 1995. Étude phyto-écologique de la steppe à *Artemisia herba-alba* Asso. et à *Salsola vermiculata* L. au sud de Sebdou (Oranie-Algérie). Thèse Doct. Ès – Sci. Univ. Tlemcen, 153p. texte + 150p. annexes.

- BENABADJI, N. BOUAZZA, M. METGE, G. et LOISEL, R. 1996. Description et aspects des sols en région semi-aride et aride au sud de Sebdou (Oranie, Algérie). *Bull. Inst. Sci. Rabat*, 20: 77-86.
- BENABADJI, N. 1991. Etude phyto-écologique de la steppe à *Artemisia herba-alba* Asso. dans l'Oranie. (Algérie occidentale). *Rev. Sech.* Vol. 11(2) : 117-125.
- BENABADJI, N. 1999. Physionomie, organisation et composition floristique des Atriplexaies au Sud de Tlemcen, Chott el-Gharbi (Algérie). *Atriplex in vivo*, N°8, Orsay Paris Sud: 1-7.
- BENABADJI, N. BENMANSOUR, D. BOUAZZA, M. 2007. La flore des monts d'Ain Fezza dans l'ouest algérien, biodiversité et dynamique. *Sciences & technologie C*– N°26: 47-59.
- BENABADJI, N. et BOUAZZA, M. 2000. Contribution à une étude bioclimatique de la steppe à *Artemisia herba-alba* Asso., dans l'Oranie (Algérie occidentale). *Rev. Sech.* Vol. 11(2) : 117-123.
- BENABADJI, N. et BOUAZZA, M. 2002. Contribution à l'étude du cortège floristique de la steppe au sud d'El-Aricha (Oranie – Algérie). *Sci. Techn.* N° spécial D. pp. 11-19.
- BENDAANOUN, M. 1981. Étude synécologique et syndynamique de la végétation halophile et hygro-halophile de l'estuaire de Bouregreg (Littoral atlantique du Maroc). Application et perspectives d'aménagement. Thèse Doct. Ing. Fac. Sci. et Tech. S^t Jérôme, Aix– Marseille, 221p. + annexes.

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

- BENDAANOUN, M. 1981. Étude synécologique et syndynamique de la végétation halophile et hygro-halophile de l'estuaire de Bou-regreg (Littoral atlantique du Maroc). Application et perspectives d'aménagement. Thèse Doct. Ing. Fac. Sci. et Tech. S^t Jérôme, Aix– Marseille, 221p. +annexes.
- BENDAANOUN, M. 1991. Contribution à l'étude écologique de la végétation halophile, halohygrophile et hygrophile des estuaires, lagunes, deltas, et Sebkhas du littoral atlantique et méditerranéen et du domaine continental du Maroc. Thèse Doct. Sci. Nat. Univ. Aix-Marseille III. 439p. + annexes.
- BOUAZZA, M. 1991. Étude phyto– écologique de la steppe à *Stipa tenacissima* L. au sud de Sebdou (Oranie-Algérie). Thèse Doct. d'Etat, Univ. Aix-Marseille III, 119p. + annexes.
- BOUAZZA, M. 1995. Étude phyto– écologique des steppes à *Stipa tenacissima* L. et *Lygeum spartum* L. au sud de Sebdou (Oranie – Algérie). Thèse Doct. Es – Sci. Univ. Tlemcen, 153p. + annexes.
- BOUAZZA, M. BENABADJI, N. LOISEL, R. et METGE, G. 2004. Evolution de la végétation steppique dans le sud-ouest de l'Oranie (Algérie). *Rev. Ecol.* Tome 30, Fasc. 2: pp. 219-233.
- BOUKHRIS, M. et LOSSAINT, P. 1975. Aspects écologiques de la nutrition minérale des plantes gypsiophiles de Tunisie. *Ecol. et Biol. du sol*, Vol.12, (1).
- BOULAIN, J. 1957. Etude des sols des plaines du Chélif. Services des Etudes Scientifiques. *Travaux des sections d'Agrologie et de*

- Pédologie*. Etude régionale N°7. Clairbois-Birmandreix. Algérie. 582p.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1952. Phytosociologie appliquée. Comm. SIGMA N° 116.
- CHAABANE, A. 1993. Étude de la végétation du littoral septentrional de Tunisie: Typologie, syntaxonomie et éléments d'aménagements. Thèse Doct. Es – Sci. Univ. Aix-Marseille III, 205 p. + annexes.
- CHEVERY, C. et ROBERT, M. 1993. Salures des sols maghrébins: influence sur les propriétés physico-chimiques des sols. Répercussions des modifications de ces dernières sur la fertilité notamment azotée des sols. ENSA., Rennes, 59p.
- DE BOODT, M. 1993. Sécheresse et salinisation des terres de culture : une nouvelle approche. *In*: Désertification et aménagement. Cours des séminaires, 1993, Médenine (Tunisie)–Agadir (Maroc), pp.121-131.
- DJEBAILI, S. 1984. Steppe algérienne, phytosociologie et écologie. O.P.U. Alger.
- DUBOST, D. 1966. Les champignons des sols salés de l'Ouest algérien. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afri. Nord*, Tome 57, pp. 9-29.
- DUBUIS, A. et SIMONNEAU, P. 1957. Les unités phytosociologiques des terrains salés de l'Ouest algérien. Pub. de la DHER.
- DUBUIS, A. et SIMONNEAU, P. 1960. Contribution à l'étude de la végétation des bassins fermés du plateau d'Oran. Travaux des sections pédologiques et agrologiques, Alger D.H.E.R. 11, 120p.

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

- DURAND, J.H. 1958. Contribution à l'étude des sols formés sur roches éruptives de l'Oranie occidentale. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, Alger, Tome 49, Fasc. 3 et 4, pp. 1-115.
- GHEZLAOUI, B.E. 2011. Biomorphologie et polymorphisme des appareils aériens de quelques espèces halophytes en Oranie, cas de *Atriplex halimus* L. et *Tamarix gallica* L. Thèse Doct. en Biol. Univ. Tlemcen. 338p. + annexes.
- HADDOUCHE, I. TOUTAIN, B. SAIDI, S. MEDERBBAL, K. 2008. Comment concilier développement des populations steppiques et lutte contre la desertification? Cas de la Wilaya de Nâama (Algérie). *New Medit. Trimestral*-Vol. VII- n.3- Septembre 2008.
- HALITIM, A. 1973. Étude expérimentale de l'amélioration des sols sodiques d'Algérie en vue de leur mise en valeur. Thèse Doct. d'État, Univ. Rennes, 170p.
- HALITIM, A. 1988. Sols des régions arides d'Algérie. Éd. O.P.U. (Alger), 384p.
- KILLIAN, Ch. 1948. Conditions édaphiques et réactions des plantes indicatrices
- KILLIAN, CH. 1954. Plantes fourragères types des hautes plaines algériennes, leur rôle particulier en période sèche. *Ann. Amél. Plan Paris* (4) pp.505-527.
- MERZOUK, A. BENABADJI, N. BENMANSOUR, D. et THINON, M. 2009. Quelques aspects édapho-floristiques des peuplements ha-

lophiles de l'Algérie occidentale. *Bull. Soc. Linn. Provence*, N°60, 58-98.

OZENDA, P. 1986. *La cartographie écologique et ses applications*. Ed. Mass. Cie. Paris, 160 p.

POUGET, M. 1973. Une manifestation particulière et méconnue de la salure dans les steppes du Sud algérois: les plages de salures sur les glacis quaternaires à croûte calcaire. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord* 1-2, pp. 15 à 24.

POUGET, M. 1980. Les relations sol-végétation dans les steppes Sud-Algéroises. Thèse Doct. d'État, Univ. Aix-Marseille III. 555p.

QUEZEL, P. et SIMONNEAU, P. 1960. Quelques aspects de la végétation des terrains salés des plaines sub-littorales de l'Oranie orientale. Travaux des sections pédologie et agrologie, *Bull.* (6), 27p.

RUELLAN, A. 1971. Les sols à profil calcaire différencié des plaines de la basse Moulouya (Maroc oriental). Mémoires ORSTOM contributions à la connaissance des sols des régions méditerranéennes, 198p. + annexe.

SARI-ALI, A. 2004. Etude des relations sol-végétation de quelques halophytes dans la région nord de Remchi. Mém. Mag. Univ. Tlemcen. 199p.

SERVANT, J. 1970. Etude expérimentale de l'influence des conditions salines sur la perméabilité des sols, conséquences pédologiques. *Science du sol* (2), pp. 87-101.

Aspects physiologiques de la végétation halo résistante et halophile du Nord et du Sud de l'Algérie occidentale

- SERVANT, J. 1975. Contribution à l'étude pédologique des terrains halomorphes. L'exemple des sols salés au sud et au sud-ouest de la France. Thèse Doct. d'Etat Montpellier, S.E.S. INRA, 2 tomes, I: 194p; II: Fig., Pl. et annexes.
- SIMONNEAU, P. 1952. Végétation des dunes littorales du golfe d'Arzew (Damesne – Saint Leu – La Macta – Oureah). Publication de l'inspection générale de l'agriculture.
- SIMONNEAU, P. 1961. Les centres d'études d'irrigation du Sahara occidental. Essais et études de la campagne 1957-1958-1959-1960. Trav. Sect. Pédologie et Agrobiologie N°5 et 6. *Publ. Serv. Etudes scientifiques*.

Notas

1. Laboratoire d'Ecologie et gestion des Ecosystèmes naturels

Faculté des Sciences de la nature et de la vie et des Sciences de la terre et de l'univers, Université Abou-Bekr Belkaid, N° 316 Les Dahlias Kiffane, Tlemcen B.P13000. Algérie

Auteur correspondant: Bahae-Ddine Ghezlaoui

E.mail: bahaeben@yahoo.fr