MEDITERRANEA

SERIE DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS

2012 Época II N° 23

COMITÉ CIENTÍFICO:

G.U. CARAVELLO

S.G. CONARD

A. FARINA

A. FERCHICHI

L. TAÍQUI

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias

Revista electrónica anual

COMITÉ CIENTÍFICO:

S. G. CONARD. USDA Forest Service. Riverside. U.S.A.
A. FARINA. Lab. Ecología del Paisaje. Museo Historia Natural. Aulla. Italia.
A. FERCHICHI. I.R.A. Medenine. Túnez.
G.U.CARAVELLO. Istituto di Igiene. Università di Padova. Italia.
L. TAÏQUI. Université Abdelmalek Essaâdi. Tetuán. Marruecos.

COMITÉ EDITORIAL:

V. Peiró, J. Martín, A.Pastor-López, E. Seva.

DIRECCIÓN:

Eduardo Seva. Dep. Ecología. Fac. de Ciencias. Universidad de Alicante.

SECRETARÍA:

Victoriano Peiró (V.peiro@ua.es). Dep. Ecología. Universidad de Alicante.

EDITA:

Servicio de Publicaciones. Universidad de Alicante.
<http://publicaciones.ua.es>

CORRESPONDENCIA:

Departamento de Ecología. Fac. de Ciencias. Universidad de Alicante.
Ap. 99 - 03080 Alicante. España.
Teléfono de Secretaría: +34965903400, ext 2255
Fax: Rev. Mediterránea. Dep. Ecología. 96/5903464

I.S.S.N.: 0210-5004

Depósito Legal: A-1059-1984

Maquetación:

Marten Kwinkelenberg

Portada

Créditos

BELDA, A.; MARTÍNEZ, J.E.; ZARAGOZÍ, B.; FERRI, V. y
PEIRÓ, V.

**Estimación del hábitat del jabalí (*Sus scrofa*
Linnaeus 1758) en el Parque Natural de la Serra de
Mariola mediante Sistemas de Información
Geográfica..... 10**

BELDA, A.; MUNERA, P.; PEIRÓ, V.; MARTÍNEZ, J.E. & SEVA, E.

**Abundancia y distribución de especies
depredadoras sometidas a control en gestión
cinagética: Estudio de caso representativo de la
urraca (*Pica pica*) en la comarca de la Marina Baja 32**

BENARADJ, Abdelkrim; BOUAZZA, Mohamed &
BOUCHERIT, Hafidha

**Diversité floristique du peuplement à *Pistacia*
atlantica Desf. dans la région de Béchar (Sud-ouest
algérien)..... 66**

ENTRADI, E.

**Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale
(I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante 90**

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.; BELDA ANTOLÍ A.; BELLOD CALABUIG, F.J.; MARTÍNEZ-PÉREZ J.E. & MARTÍN CANTARINO, C.

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET 117

HACHEMI, Nouria; HASNAOUI, Okkacha; BENMEHDI, Ikram; MEDJATI, Nadjat et BOUAZZA, Mohamed

Contribution à l'étude de la thérophytisation des matorrals des versants sud des monts de Tlemcen (Algérie occidentale) 158

MARTÍNEZ-PÉREZ, J.E.; SEVA, E.; BELDA, A.; PASTOR-LÓPEZ, A. & MARTÍN, J.

Plan de restauración y conservación del humedal urbano de Calpe, Alicante (SE España) 181

SAAD, Karim; INTISSAR, Zarrouk; MAZGHOUNI, Mohamed; FERRI VILA, Vicente & MLAOUHI, Amor

Valoración energética de subproductos de palmera datilera 232

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.(1); BELDA ANTOLÍ A.(2); BELLOD CALABUIG, F.J.(1); MARTÍNEZ-PÉREZ J.E.(3) & MARTÍN CANTARINO, C.(1) (4)

Resumen

Este trabajo es el segundo de una serie de estudios que se realizó para caracterizar las comunidades vegetales presentes en ambientes litorales en el SE de la provincia de Alicante, mediante el cartografiado de zonas homogéneas y el empleo de los catálogos propuestos por el RAC-SPA y Medwet. Se han determinado 11 unidades ambientales en el sector analizado que se corresponde al Clot de Galvany y Balsares, las cuales se han descrito y se han representado en 2

mapas que permite comparar las diferencias entre ambos catálogos. De este modo, se seleccionaron 10 parcelas al azar y su vegetación fue muestreada según la metodología, basada en transectos, denominada «quadrat technique» y se identificaron las diferentes especies vegetales en el campo. Por otro lado, la medida de la cobertura vegetal total también fue tomada según la metodología de «Braun Blanquet». Se han empleado los programas informáticos CartaLinx® y Arc-View® para el cartografiado de las unidades vegetales. Así, la finalidad de este trabajo es proporcionar una serie de herramientas técnicas para poder garantizar la gestión sostenible de la compleja situación de la zona de estudio, así como de sus recursos naturales.

Palabras clave: RAC/SPA, Medwet, vegetación halófila, vegetación hidrófila, GIS, humedales y semiárido.

Abstract

This is the second work in a series of studies which was conducted to characterize the plant communities found in coastal environments in the SE of the Alicante province, through the mapping of homogeneous areas of vegetation with the use of two catalogs proposed by the RAC-SPA and Medwet. Moreover, we have determined 11 environmental units in each of the

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

sectors in the study area («Clot de Galvany» and «Balsares»), they have been described and represented in two maps for comparing the differences between both catalogs. Thus, 10 plots were selected randomly and vegetation was sampled according to the methodology, based on transects, called «quadrat technique» and we identified different plant species in the field. On the other hand, the measure of total plant cover was also taken according to the methodology of «Braun Blanquet». CartaLinx ® and ArcView ® Software have been used for mapping the vegetation units. The aim of this paper is to provide technical tools in order to ensure sustainable management of the complex situation of the study area, as well as its natural resources.

Keywords: RAC/SPA, Medwet, halophytic vegetation, hydrophilic, GIS, wetlands and semiarid.

Introducción

Los humedales costeros del Mediterráneo, y especialmente los del SE de la península Ibérica no son muy abundantes y están especialmente amenazados por la acción del hombre. Gran parte del litoral de la Comunidad Valenciana está ocupado por un corredor de humedales dulceacuícolas, albuferas y marjales antropizados en mayor

o menor medida, se extienden desde el Delta del Ebro y el cabo de la Nao, mientras que al sur podemos encontrar diversos saladares y lagunas salinas (Eguibar Galán M.A. et al., 2007). Estos ecosistemas están sometidos a un estrés ambiental debido a la proximidad del mar que afecta a las especies vegetales que allí viven (Chapman, 1974). Es por ello que en estas zonas encontramos comunidades vegetales muy específicas y de elevado interés. Las comunidades vegetales allí existentes suelen ser en su mayor parte plantas halófilas e higrófilas. Debido a todo esto, se consideran unas zonas de especial interés desde el punto de vista biótico, agropecuario-extractivo, turístico, recreativo, cinegético, hídrico, paisajístico, etnológico, didáctico y científico (Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, Consellería de Medio Ambiente, 2002).

Durante miles de años, los humedales de la cuenca mediterránea han proporcionado servicios esenciales a la población de la región, agua, alimentos, materiales, transporte y han actuado como telón de fondo para sus actividades sociales y culturales (Mediterranean Wetlands Conference, 1996). A partir de la primera mitad del siglo XX, los humedales del Mediterráneo han sido destruidos y degradados, para evitar la aparición de enfermedades, para expandir la agricultura

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

y para construir masivamente edificios y urbanizaciones. A partir del Simposio de Grado (Italia) en 1991 creció MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative), una asociación entre la Comisión Europea, Ramsar y los gobiernos de Francia, Grecia, Italia, Portugal y España, y varias ONGs. El proyecto MedWet tiene como objetivo parar y revertir la degradación de estos ecosistemas. Como resultado han producido y probado una serie de herramientas de interés para la conservación y uso de los humedales en todo el Mediterráneo (Mediterranean Wetlands Conference, 1996). El catálogo MedWet para la descripción de los humedales está basado en el bien documentado y exhaustivo sistema establecido por Cowardin et al. (1979) «National Wetland Inventory of the United States of America» (J.C. Farinha, L.Costa, 1996).

Posteriormente, en 1997, las partes contratantes de la Convención para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Polución adoptaron criterios comunes para la realización de inventarios de los lugares de interés conservacionista. Se encargó al RAC-SPA (*Regional Activity Centre for Specially Protected Areas*) elaborar las herramientas necesarias para esta unificación de criterios. Esta organización, en colaboración con diversos expertos, ha venido trabajando en la adopción de sistemas de clasificación comunes para el caso de

los hábitats marinos. Realizada satisfactoriamente esta labor, el RAC/SPA se encargó de la labor de extender a los hábitats costeros la adopción de sistemas de clasificación y caracterización comunes. En Noviembre de 2001, se realizó una comisión de expertos en Montpellier para adoptar un criterio común para describir y clasificar los hábitats de las zonas costeras de la región Mediterránea (hábitats terrestres y humedales). RAC/SPA presentó un borrador de clasificación basado parcialmente en el sistema CORINE de la Comunidad Europea, adoptado en parte en la Directiva Hábitat. La reunión de Montpellier finalmente redactó la «*Draft Classification of Coastal (Terrestrial and Wetland) Habitat Types for the Mediterranean Region*» clasificando los diferentes ecosistemas litorales realizando diversas modificaciones. Debido a la existencia de estos catálogos anteriormente mencionados, el RAC/SPA puso en práctica los dos catálogos para compararlos entre sí.

La zona de estudio se corresponde con el Clot de Galvany-Balsares y sobre ella se han realizado diversos estudios científicos de distintas áreas. Estudios muy generales como el de Robledano F. et al. (1987) sobre la tipología, conservación y gestión de las zonas húmedas del sureste español o el de Eguibar Galán M.A. et al. (2007) sobre los aspectos meto-

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

dológicos del catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, dónde se incluye la zona de estudio. Otros trabajos son más específicos. Los de Matarredona Coll, E. (1985, 1986) que versan sobre la aplicación de la fotografía aérea en la cartografía de suelos y la cartografía de las asociaciones edáficas del Baix Vinalopó. Las memorias anuales del Servicio de Control y Educación Ambiental del P.N.M. (Paraje Natural Municipal) Clot de Galvany, que tratan sobre iniciativas sobre la vegetación, la fauna y la educación ambiental del paraje. Finalmente, cabe mencionar los estudios realizados por Valera Lozano A. et al. (2011) sobre los cambios en los usos y coberturas del suelo en el municipio de Elche, y por Meléndez-Pastor I. (2009) et al. acerca de los cambios del suelo obtenidos mediante teledetección espacial en el Clot de Galvany. Este último estudio es muy similar al nuestro, solo que las categorías de agrupación de los usos del suelo son muy escasas y se han realizado mediante algoritmos de agrupamientos a través de las imágenes de teledetección.

Son varias las razones que nos han llevado a realizar este estudio. Una de ellas es la gran amenaza sufrida en los humedales costeros del Mediterráneo por la excesiva presión antrópica y la singularidad de estos enclaves, especialmente en el Clot de Galvany. Otra de las razones es la existencia

de iniciativas por parte de varios organismos internacionales que nos proveen de herramientas para poder trabajar sobre estos hábitats. Por último, cabe destacar la falta de estudios en los que se caracterice la zona de trabajo con más detalle a nivel cartográfico, usando las metodologías anteriormente mencionadas.

Área de estudio

El área de trabajo se conoce como «*Zonas Húmedas de Elche-Santa Pola*», situada en el litoral del sur de la provincia de Alicante y, concretamente en este caso, estudiaremos el Clot de Galvany– Balsares que se encuentra en los términos municipales de Elche y Santa Pola.

Exceptuando la charca de Balsares, que pertenece al término municipal de Santa Pola, el resto de la zona queda incluida en el P.N.M del Clot de Galvany que fue declarado como tal en el año 2005. Este paraje comprende una superficie de 355,84 ha y depende en su totalidad del ayuntamiento de Elche (Consellería de Medi Ambient, Generalitat Valenciana). Además está incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana de 2002, es considerado como ZEPA (zona de especial protección para las aves) y forma parte del LIC (lugar de interés comunitario) de Isla de Tabarca.

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

Figura 1: Localización del Clot de Galvany (1:80.000) dentro de la Provincia de Alicante.

La zona de estudio es una pequeña depresión endorreica costera cerrada por restingas o pequeñas colinas de calizas oolíticas. Los materiales que componen esta depresión pertenecen al Cuaternario y son en su mayor parte de formación detrítica, procedentes de la meteorización de las sierras y colinas adyacentes, configurando unas formaciones cuaternarias representadas por los glaciares, que ocasionalmente muestran afloramientos de conglomerados y arcillas del Pleistoceno, y depósitos aluviales indiferenciados que tapizan los fondos de las áreas subsidentes (Materrodona Coll, E., 1986).

El clima en esta comarca se caracteriza por ser mediterráneo con aparición del piso bioclimático termomediterráneo. La temperatura media anual es de 17,4°C, siendo el mes de Enero el más frío con 11,5°C de media y el mes Agosto el más cálido con una temperatura de 25,1°C de media. Las heladas son prácticamente nulas. Las precipitaciones medias rondan los 300 mm, siendo más frecuentes en Otoño y Primavera (Gozálvez-Pérez, 1977). Por lo tanto estamos hablando de una zona, según Thornthwaite, encuadrada en el semiárido en el límite con el árido, en la cual los recursos hídricos son muy escasos.

Este lugar tan singular ha estado sometido a una gran presión antrópica. En 1979 debido al proyecto urbanístico «lago de Elche» se comienza a desecar el humedal y a realizar movimientos de tierra. Aunque finalmente no se llevo a cabo dicho proyecto, el daño ya estaba hecho (Palazón Ferrando, S. et al., 2002). A posteriori, se siguió construyendo urbanizaciones, quedando el humedal totalmente rodeado por urbanizaciones. En la actualidad el humedal se ha regenerado y restaurado, pero es cierto que sigue estando sometido a una elevada presión antrópica.

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

Metodología

Para llevar a cabo este estudio se han empleado dos catálogos diferentes, pero al mismo tiempo complementarias, con el fin de caracterizar diferentes ambientes litorales del sector semiárido del sur de la Provincia de Alicante. De este modo, se compara la descripción de ambientes según los criterios establecidos por las comisiones RAC-SPA y MedWet.

Trabajo de campo

El área de estudio fue analizada durante varias sesiones llevadas a cabo en la primavera de 2003 con la ayuda del material científico, mapas topográficos y fotogramas aéreos. Las unidades homogéneas se establecieron de forma preliminar teniendo en cuenta las características botánicas y ambientales del territorio, definiendo dichas unidades en el campo. Para cada una de las unidades homogéneas se asignaron por lo menos 10 parcelas al azar y su vegetación fue muestreada según la metodología, basada en transectos, denominada «*quadrat technique*» (Grant, 1981). De este modo, se identificaron las diferentes especies vegetales en el campo. La medida de la cobertura vegetal total también fue tomada según la metodología de Braun Blanquet (1965). Se indica el porcentaje de cobertura mediante los siguientes símbolos:

Porcentaje	Símbolo
<1%	+
1-5	1
6-25	2
26-50	3
51-75	4
76-100	5

También se tomaron los datos de campo que permitieron identificar los diferentes usos del territorio, tanto en la zona húmeda del Clot de Galvany como en sus alrededores.

Trabajo cartográfico

Según la metodología de Medwet y RAC/SPA, y después del análisis de los datos de campo, se han reconocido una serie de zonas homogéneas en el área de estudio. Estas unidades se han delimitado y se han trazado en la Unidad de Cartografía de los Recursos Naturales de la Universidad de Alicante sobre las fotografías aéreas del Servicio Cartográfico de la Diputación de Alicante (vuelo 1999-2001, escala 1:25000). Las imágenes se han escaneado con una resolución de 600x600 píxeles, se han exportado como un mapa de bits (BIPMAP) y después se han remuestreado con el software *ER Mapper®*, con 40 puntos de referencia y control para cada fotograma.

El software CartaLinx® se ha usado para la delimitación de las unidades ecológicas de y los diferentes usos del territorio

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

sobre el archivo BITMAP, obteniendo así polígonos cerrados sobre el mapa, que cubren todo el área de estudio y cuya forma es exportable como un archivo para ser empleado posteriormente.

Con el software de ArcView® las formas cartografiadas se han ajustado a la zona de estudio. Para presentar los resultados las imágenes incorporan una serie de colores y una leyenda de dichos colores que señalan las diferentes categorías encontradas. Finalmente, los mapas georreferenciados se han exportado en formato *.jpg (300 dpi), empleando la extensión layout.

Resultados

En el presente apartado figura una breve descripción de las zonas homogéneas encontradas en el área de estudio y la correspondiente clasificación de las mismas según las metodologías propuestas.

1. Zona de Dunas. «Slack» este

Se trata de una cubeta litoral situada en el cordón dunar próxima a la línea de costa. En cuanto a su edafología el suelo presenta textura arenosa y abundante materia orgánica (como consecuencia de la senescencia foliar y el acumulo de

restos vegetales sobre la superficie del mismo). El suelo de la zona está encharcado debido a que el nivel freático es muy elevado. Dicha majada presenta un mayor grado de salinidad debido a la proximidad de la línea costera.

Especies vegetales encontradas:

Especie	Cobertura
<i>Juncus acutus</i>	2
<i>Sarcornia fruticosa</i>	2
<i>Tamarix canariensis</i>	2
<i>Juncus maritimus</i>	1
<i>Phragmites australis</i>	1
<i>Inula crithmoides</i>	1
<i>Inula viscosa</i>	+
<i>Cynanchum acutum</i>	+
<i>Crucianella maritima</i>	+

Clasificación MedWet (figura 1):

System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Ever-green

En esta zona las especies dominantes son las siguientes:
Juncus acutus, *Sarcornia fruticosa* y *Tamarix canariensis*.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura2):

Salt-marshes, salt steppes and salt scrubs (15) – Mediterranean and Thermo-Atlantic salt meadows (15.5) – Medite-

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

rranean tall rush saltmarshes (15.51) – Euromediterranean coastal tall rush-saltmarshes (15.511).

2. Zona de Dunas. «Snack» oeste

Se trata de una cubeta litoral situada en el cordón dunar más alejado a la línea de costa. En cuanto a su edafología el suelo presenta textura arenosa y una menor proporción de materia orgánica respecto a la anterior majada. El suelo no está tan encharcado como en la anterior majada, ya que se encuentra en una zona más elevada y por lo tanto el nivel freático es más profundo respecto a la superficie. En el borde exterior de dicha majada encontramos dunas fósiles.

Especies vegetales encontradas:

Especie	Cobertura
<i>Sarcornia fruticosa</i>	3
<i>Juncus acutus</i>	2
<i>Juncus maritimus</i>	2
<i>Tamarix canariensis</i>	2
<i>Phragmites australis</i>	2
<i>Inula crithmoides</i>	1
<i>Cynanchum acutum</i>	+
<i>Pistacia lentiscus</i>	+
<i>Phoenix dactylifera</i>	+
<i>Helichrysum stoechas</i>	+
<i>Limonium furfuraceum</i>	+
<i>Limonium cossonianum</i>	+

En estas majadas vamos a encontrar Crustáceos terrestres pertenecientes al SuperO. Peracárida. En ella destacamos la presencia de Isopodos (Género Armadillum) y Anfípodos (Género Talitrus). Además podemos encontrar coleópteros tenebriónidos y Staphilinidos; ortópteros (del género Acrida), licósidos y erésidos (O.Araneae), asílidos (O. Dipteros).

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Evergreen

En esta zona las especies vegetales dominantes son las siguientes: *Sarcornia fruticosa*, *Tamarix canariensis*, *Juncus acutus*, *Juncus maritimus* y *Phragmites australis*.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Salt-marshes, salt steppes and salt scrubs (15) – Mediterranean and Thermo-Atlantic salt meadows (15.5) – Mediterranean tall rush saltmarshes (15.51) – Euromediterranean coastal tall rush-saltmarshes (15.511)

Ambas majadas se clasifican en la misma categoría empleando la metodología de RAC/SPA y MedWet, ya que presentan una composición vegetal similar.

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

3. Dunas fijas o estabilizadas

La unidad ambiental descrita se caracteriza por ser un depósito eólico costero, donde las partículas se han estabilizado gracias a la plantación de pino carrasco por parte del hombre, con el fin de evitar el avance dunar hacia el interior.

En cuanto a su edafología hay que decir que se trata de un suelo arenoso, alto contenido en sales, alto grado de humedad y restos de materia orgánica en descomposición fundamentalmente de origen animal.

Especies vegetales encontradas:

Especie	Cobertura
<i>Pinus halepensis</i>	4
<i>Teucrium polium</i>	+
<i>Phagnalon saxatile</i>	+
<i>Lygeum spartum</i>	1
<i>Ephedra fragilis</i>	+
<i>Chamaerops humilis</i>	+
<i>Atriplex glauca</i>	+
<i>Sideritis leucantha</i>	+
<i>Brachypodium retusum</i>	+

En esta unidad ambiental vamos a encontrar grupos de artrópodos endémicos y amenazados de la zona Ibero-levantina. En ella podemos destacar la presencia de la *Paratriodonta alicantina* (Fam. Melolontidae, O. Coleópteros) y la *Cicindela deserticota* (Fam. Cicindélidos, O. Coleópteros). Se trata de

especies amenazadas debido a la desaparición de las zonas dunares (tanto litorales como interiores) del sureste de España. Por lo tanto para poder proteger estas especies de artrópodos se debe conservar el hábitat. En esta zona podemos encontrar otros grupos de artrópodos con un elevado valor ecológico como: los coleópteros tenebriónidos (G. Tentiria), ortópteros (del género Acridido), erésidos (G. Stegodifus que forman sus nidos en la vegetación).

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Forested – Subclasses Evergreen.

La especie dominante es *Pinus halepensis*.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Forests (4) – Temperate – coniferous forests (42) – Mediterranean pine woods (42.8) – Aleppo pine forest (42.82) – Iberian Aleppo pine forest (42.821).

4. Campo de cultivo abandonado

En esta zona encontramos distintos pies de olivo (*Olea europaea*), palmeras (*Phoenix dactylifera*), algarrobos (*Ceratonia siliqua*), y retama (*Retama sphaerocarpa*). La aparición de estas especies en una malla de plantación bastante regular

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

indica la transformación del territorio por parte del ser humano.

En cuanto a la edafología hay que reseñar que se trata de un suelo fuertemente compactado, con un escaso porcentaje en materia orgánica y textura arcillosa. Aparecen rodales con alto contenido en excrementos de conejo en algunos puntos de la unidad.

Especies vegetales encontradas:

Especie	Cobertura
<i>Piptatherum miliaceum</i>	3
<i>Foeniculum vulgare</i>	2
<i>Thymelaea hirsuta</i>	+
<i>Suaeda vera</i>	+
<i>Pistacia lentiscus</i>	+
<i>Fagonia cretica</i>	+
<i>Capparis spinosa</i>	+
<i>Carrichtera annua</i>	+
<i>Phagnalon saxatile</i>	+
<i>Lycium intricatum</i>	+
<i>Inula viscosa</i>	+
<i>Ficus carica</i>	+
<i>Punica granatum</i>	+

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Clase Artificial Modifiers – Subclase Farmed.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Temperate riverine and swamp forest and brush (44) – Southern riparian galleries and tickets (44.8) – Oleander, chaste, tree and tamarisk galleries (44.81) – Mediterraneo-macaronesian tamarisk thickets (44.813) – West Med Tamarix thickets (44.8131).

Aparece *Tamarix spp.* *Piptaterum miliaceum*, *Lycium intricatum* e *Inula viscosa* como especies dominantes del inventario.

5. Espartal

Esta unidad ambiental representa en buena medida la fuerte aridez del Sur de la provincia de Alicante, donde las condiciones para el desarrollo vegetal son muy extremas. Se encuentra ubicada en una zona de pendiente moderada (5-10%), con un suelo con textura pedregosa predominantemente y orientada hacia el sur. Podemos observar afloramientos, donde la roca madre queda al descubierto. Son observables claros signos de erosión como consecuencia de la combinación entre la pendiente y los claros de vegetación.

Especies vegetales encontradas:

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

Especie	Cobertura
<i>Stipa tenacissima</i>	4
<i>Teucrium carolipau</i>	+
<i>Teucrium capitatum</i>	+
<i>Ruta chalepensis</i>	+
<i>Ephedra fragilis</i>	+
<i>Rhamnus lycioides</i>	+
<i>Sedum sediforme</i>	+
<i>Sideritis leucantha</i>	+
<i>Fumana ericoides</i>	+
<i>Thymus vulgaris</i>	+
<i>Rosmarinum officinalis</i>	+
<i>Thymus moroderi</i>	+

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Emergent – Subclasses Persistent.

La especie dominante es *Stipa tenacissima*.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Mediterranean tall-grass and wormwood steppes (34.6) – Alpha steppes (34.61) – Iberian alpha steppes (34.611).

6. Monte repoblado

Esta categoría se encuentra situada en una zona modificada por el ser humano con el fin de fomentar la heterogeneidad

en el paisaje, mejorar la calidad ambiental del paraje y reducir el riesgo de erosión.

En las tareas de replantación se ha tenido en cuenta la conservación de algunas especies presentes en el paraje y que tienen un carácter emblemático (*Teucrium carolipau*, *Sideritis leucantha*). Dichas especies están catalogadas dentro de la categoría de las especies *raras*, *endémicas* o *amenazadas*.

El suelo de esta unidad presenta una textura pedregosa, aparece también la roca madre en algunos lugares puntuales y tiene una pendiente moderada (5-10%).

Especies vegetales encontradas:

Especie	Cobertura
<i>Pinus halepensis</i>	3
<i>Brachypodium retusum</i>	2
<i>Hypericum erucoides</i>	1
<i>Stipa tenacissima</i>	1
<i>Teucrium carolipau</i>	+
<i>Ruta chalepensis</i>	+
<i>Sedum sediforme</i>	+
<i>Fumana erucoides</i>	+
<i>Rhamnus lycioides</i>	+
<i>Sideritis leucantha</i>	+

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Forested – Subclasses Evergreen.

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

La especie dominante es *Pinus halepensis*.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Forests (4) – Temperate – coniferous forests (42) – Mediterranean pine woods (42.8) – Aleppo pine forest (42.82) – Iberian Aleppo pine forest (42.821).

7. Charcas. Zona seca

En las diferentes charcas del Clot de Galvany podemos encontrar diversas especies de aves. Algunas de estas especies están amenazadas, como la cerceta pardilla (*Marmaronetta angustirostris*), el porrón pardo (*Aythya nyroca*) y la malvasía cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*). Además el Clot ha sido un importante enclave para gran número de ardeidas, destacando por su abundancia la presencia de la garceta común (*Egretta garzetta*). En los últimos años, el Clot ha sido un importante enclave para gran número de ardeidas, destacando por su abundancia la presencia de la Garceta Común (*Egretta garzetta*). Uno de los grupos de la ornitofauna mejor representados es el de los limícolas, con interesantes colonias reproductoras de cigüeñuelas. Por ello la zona presenta un alto valor ecológico desde el punto de vista de la conservación.

En esta zona se está produciendo la colonización de especies pioneras en el borde de la charca adaptadas a un elevado grado de salinidad. En ella podemos encontrar a especies pioneras como *Sarcocornia fruticosa* y *Sarcocornia alpini*. Como resultado de los constantes cambios que sufre el nivel del agua de la charca se produce un cambio de condiciones tan brusco que implica la desaparición de numerosos individuos de *Sarcocornia* spp. Por este motivo se pueden apreciar en el medio algunos pies muertos dispersos, cuando el nivel del agua es bajo.

La textura del suelo es esponjosa, apareciendo algunas costras de carbonato cálcico de forma dispersa. Por debajo de la superficie encontramos depósitos de sulfuro de hidrógeno debido a las condiciones anaeróbicas de descomposición de la materia orgánica.

Especies vegetales encontradas:

Especie	Cobertura
<i>Sarcocornia fruticosa</i>	2
<i>Sarcocornia alpini</i>	+

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Water surface – Subclasses salt crust.

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

La especie dominante es *Sarcocornia fruticosa*.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Saltmarshes, salt steppes, salt scrubs (15) – Mediterraneo-nemoral saltmarsh scrubs (15.6) – Shrubby glasswort thickets (15.612).

8. Charcas. Zonas inundadas

Esta unidad ambiental se encuentra permanentemente inundada en la actualidad, ocupando la zona más deprimida del paraje. Aparecen algunas manchas poco abundantes de carrizo (*Phragmites australis*), cuyos valores de cobertura son inferiores al 20 %. Estas charcas, debido al clima de la zona, pueden aparecer totalmente secas en diversas épocas del año, sobre todo en verano.

El suelo ofrece una textura fina y esponjosa, se producen fenómenos de anaerobiosis en profundidad y aguas eutrofi-zadas.

Especies vegetales encontradas:

Especie	Cobertura
<i>Phragmites australis</i>	2
<i>Ruppia maritima</i> subsp. <i>rostellata</i>	+
<i>Chara hispida</i>	+

En la periferia y el borde exterior de la charca vamos a encontrar los siguientes grupos de artrópodos: larvas de Quironómidos (O. Dipteros), Sífidos (O. Dipteros) y dermápteros (*Labidura riparia*). Las aguas de la charca central poseen un elevado grado de eutrofización ya que en ellas encontramos larvas de Quironómidos (bioindicador). En el estadio larvario los individuos viven enterrados en el sedimento y soportando niveles bajos de oxígeno (ya que poseen hemoglobina). Por lo tanto podemos concluir que las aguas de esta charca están en condiciones anaeróbicas.

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Water surface – Subclasses Mud.

La especie dominante es *Phragmites australis*.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Bogs and marshes (5) – Water fringe vegetation (53) – Reed beds (53.1) – Common reed beds (53.11) – Floated *Phragmites* beds (53.111) – Freshwater *Phragmites* beds (53.1111).

9. Orla de Tarays (*Tamarix spp.*)

Alrededor de la charca central se dispone una franja arbustiva de *Tamarix boveana* y *Tamarix canariensis*, cuyo porte es

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

inferior a los 6 metros de altura. Dichas especies arbustivas se combinan con otras de carácter herbáceo que tienen alto valor desde el punto de vista conservacionista.

En esta zona la humedad del suelo ya no es tan elevada y el tamaño de grano es mayor (arenoso).

Especie	Cobertura
<i>Tamarix boveana</i>	4
<i>Tamarix canariensis</i>	
<i>Suaeda vera</i>	1
<i>Sarcocornia fruticosa</i>	1
<i>Limonium cossonianum</i>	+
<i>Limonium furfuraceum</i>	+
<i>Limonium delicatulum</i>	+

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Evergreen.

Se trata de formaciones vegetales leñosas de *Tamarix* spp. que presentan una altura inferior a los 6m.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Temperate riverine and swamp forest and brush (44) – Southern riparian galleries and tickets (44.8) – Oleander, chaste, tree and tamarisk galleries (44.81) – Mediterraneo-macaronesian tamarisk thickets (44.813) – Hypersaline medi-

terranean tamarisk thicket (44.8134) – Saline *Tamarix canariensis* stans (44.81342).

10. Matorral xerófilo de *Sarcocornia* spp.

Se trata de una zona extensa dominada por la presencia de *Sarcocornia fruticosa* que ocupa un grado de cobertura superior al 80%.

La textura del suelo es arcillo-limosa, presentando una alta proporción de materia orgánica. Además de ello el suelo presenta una estructura esponjosa y una elevada humedad.

Especie	Cobertura
<i>Sarcocornia fruticosa</i>	5
<i>Suaeda vera</i>	+

En esta zona vamos a encontrar pequeños claros de vegetación dónde aparecen otras especies vegetales como: *Suaeda vera*, *Limonium* spp., *Juncus* spp., *Inula crithmoides*, *Inula viscosa*. En esta área vamos a encontrar pies dispersos de *Tamarix* spp.

En el matorral Xerófilo vamos a encontrar los siguientes grupos de artrópodos terrestres: *Buthus occitanus* (O. Scorpio-nes), escolopendras, como la *Scolopendra cingulata* (Cl. chilopoda), therídidos y erésidos (O. Araneae), solífugos (*Gluvia dorsalis*), fórmidos (del género *Cataglyfis*), coleopteros me-

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

loideos (género *Meloe*), coccinélidos, lampíridos, larvas de cerambícidos y maláquidos. Se trata de una zona con un alto valor ecológico dónde se debe priorizar la conservación del hábitat con la finalidad de proteger de la entomofauna existente.

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Scrub-shrub – Subclasses Evergreen.

La especie dominante es *Sarcocornia fruticosa*.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Saltmarshes, salt steppes, salt scrubs (15) – Mediterraneo-nemoral saltmarsh scrubs (15.6) – Shrubby glasswort thickets (15.612).

11. Carrizal

Se trata de una unidad ambiental extensa de carrizo que se encuentra inundada de forma temporal. Presenta valores muy elevados de cobertura vegetal donde domina la especie *Phragmites australis*. En los bordes exteriores de dicha mancha podemos encontrar otras especies herbáceas de gran valor ecológico.

Especie	Cobertura
<i>Phragmites australis</i>	4
<i>Inula viscosa</i>	+
<i>Juncus acutus</i>	+
<i>Scirpus holoschoenus</i>	+
<i>Limonium cossonianum</i>	+
<i>Limonium furfuraceum</i>	+

Las especies siguientes especies vegetales las vamos a encontrar en el borde exterior del carrizal. Entre ellas destacamos: *Inula viscosa*, *Juncus acutus*, *Limonium cossonianum* y *Limonium furfuraceum*.

Clasificación MedWet (figura 2):

System Palustrine – Class Emergent – Subclasses Persistent.

Especie dominante *Phragmites australis*.

Clasificación según la metodología RAC/SPA (figura 3):

Bogs and Marshes (5) – Water-fringe vegetation (53) – Reed beds (53.1) – Common reed beds (53.11) – Dry – *Phragmites* beds (53.112) – Dry– halophile *Phragmites* beds (53.1122)

Figura 3: Zonas homogéneas según la clasificación RAC/SPA System en el Clot de Galvany.

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

Conclusiones

El P.N.M. del Clot de Galvany se caracteriza por la gran diversidad de ambientes que alberga en sus poco más de 380 hectáreas (Generalitat Valenciana, Conselleria de Medi Ambient). En nuestro estudio hemos podido analizar 11 unidades ambientales distintas. Su clasificación según las metodologías propuestas y su representación en mapas, nos permite observar con mayor facilidad la gran diversidad de ambientes y la complejidad de la zona de estudio. Ambas metodologías son muy sencillas de aplicar, pero existen diferencias considerables entre ambas. La clasificación según el sistema MedWet es muy sencilla e intuitiva, pero las categorías que incluye son muy pocas y eso hace que unidades ambientales distintas queden catalogadas de modos similares, aunque siempre hay que indicar la especie vegetal dominante para poder diferenciarla. En el mapa creado según el sistema MedWet podemos encontrar tan solo 5 zonas homogéneas, sin contar las distintas charcas que existen en el paraje. Las unidades ambientales que quedan clasificadas en la misma categoría se diferenciarían por la vegetación dominante, que se muestra en los resultados, pero no se incluye en el mapa. Sin embargo la clasificación de zonas húmedas según la metodología RAC/SPA es un poco más compleja, debido a la existencia de gran cantidad de categorías que además inclu-

yen los distintos tipos de vegetación presentes en las zonas a clasificar. En el mapa podemos observar la existencia de 9 categorías distintas, lo que nos permite definir y diferenciar la zona de estudio con más facilidad. El estudio realizado nos proporciona una herramienta muy importante para conocer con profundidad la distribución de los distintos hábitats que podemos encontrar, como son, playas, dunas, majadas, cultivos abandonados, espartales, pinares, matorrales halófilos, charcas, carrizales y tarayales. Además, nos va a permitir hacer un seguimiento en un futuro de estos hábitats, para poder ver cómo evolucionan a lo largo del tiempo.

La gran heterogeneidad de ambientes encontrados en el Clot de Galvany hace que sea posible la existencia de una gran biodiversidad tanto vegetal como animal, lo que hace que el humedal y su entorno sea un lugar de elevado interés ecológico. En la zona de estudio podemos encontrar especies vegetales exclusivas de estos ambientes, como pueden ser todas las plantas barrilleras (con las cuales se fabricaba antiguamente el jabón y los cristales) pertenecientes a la familia de las Quenopodiáceas (*Suaeda* spp., *Sarcocornia* spp., *Atriplex* spp., etc), y endemismos exclusivos de Alicante que están catalogados en el libro rojo de especies amenazadas de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales), como *Limonium cos-*

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

sonianum y *Limonium delicatulum* cuyas categorías son de menor riesgo; *Limonium furfuraceum* cuya categoría es vulnerable (Crespo Villalba, y Lledó-Barrena, 1998) y *Teucrium carolipau* en menor riesgo, entre otras muchas. Sobre la fauna destacaremos la presencia de gran diversidad de aves, avistadas en distintas épocas del año, pero sobre todo en los meses de mayor pluviosidad que es cuando estas cuencas se inundan. Predominan las aves acuáticas y hay que prestar especial atención a la presencia y reproducción en el paraje de dos especies amenazadas como la Malvasia cabeciblanca y la Cerceta pardilla, catalogadas en peligro de extinción en la Comunidad Valenciana según el vigente y actualizado catálogo valenciano de especies de fauna amenazadas (Aranda López, J.C. et. al, 2007). Además hay que indicar la existencia de una gran diversidad de entomofauna, en la que debemos mencionar la presencia de una gran variedad de coleópteros tenebrionidos. Estos insectos pueden ser utilizados para indicarnos el estado de conservación en la que se encuentran las zonas en las que aparecen (Cartagena, M.C. et. al, 2002). En cuanto a reptiles, anfibios y mamíferos hay que señalar también la existencia de un elevado número de especies que encuentran cobijo en este paraje, ver Memoria Anual del 2007 del P.N.M. del Clot de Galvany. Toda esta fauna, vegetación y el medio físico que los alberga da conti-

nuidad a una interesante sucesión de humedales y cordones dunares desarrollados a lo largo de los aproximadamente 8 kilómetros de litoral desplegados entre las sierras de Colmenares y Santa Pola (López-Deltell, 2009).

Todo esto hace que el Clot sea un enclave muy singular, que además está sometido a una elevada presión antrópica por el desarrollo urbanístico. Por ello es necesario proteger y conservar este tipo de hábitat. En la actualidad el Clot de Galvany está declarado como P.N.M, LIC y ZEPA, llevando su gestión el ayuntamiento de Elche. Pero aún así, la zona de Balsares no está incluida dentro del P.N.M ya que pertenece al ayuntamiento de Santa Pola y eso hace que haya conflictos en la gestión del territorio.

Finalmente, con el presente trabajo se pretende proporcionar herramientas técnicas y garantizar la gestión sostenible de los humedales y sus recursos naturales, empleando las metodologías utilizadas. La caracterización de dichos ambientes con el uso de estas técnicas permite la correcta promoción y difusión de información sobre el «uso racional» de los recursos de los humedales. Estas metodologías se pueden emplear en otras regiones, pudiendo comparar las diferencias existentes entre diferentes ambientes, dada la relativa sencillez del método.

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

Bibliografía

- BENDER, O., BOEHMER H.J., JENS, D. & SCHUMACHER, K.P. (2003). Using GIS to analyse long-term cultural landscape change in Southern Germany. *Landscape and Urban Planning*, 70 (1-2): 111-125.
- BRAUN-BLANQUET, J. (1965). *Plant sociology: the study of plant communities*. Transl. rev. and ed. by C.D.Fuller and H.S. Conard, Hafner, London, 439 pp.
- CARTAGENA M.C., A. VIÑOLAS y E. GALANTE, 2002. Biodiversidad de Tenebriónidos (Coleoptera, Tenebrionidae) en saladares ibéricos. *Butll. Inst. Cat. Hist. Nat* 70: 91-104.
- CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO Y GABINETE TÉCNICO DE SECRETARÍA GENERAL. (2002). Catálogo de zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, memoria justificativa. Generalitat Valenciana.
- CONSELLERÍA DE TERRITORI I HABITATGE. (2001). Propuesta de lugares de Interés Comunitario (LICS) para la constitución de la Red Natura 2000. Generalitat Valenciana, 6 pp.
- COTA AMBIENTAL S.L. (2007), Memoria anual 2007 Servicio de Control y Educación Ambiental del P.N.M. Clot de Galvany, Ajuntament d'Elx (Regidoria de Medi –ambient), 138 pp.
- CRESPO VILLALBA, M.B. & MATEO SANZ G. (2001). Manual para la determinación de la flora valenciana. Moliner-40, 503 pp.

- CRESPO VILLALBA, M.B. & LLEDÓ BARRENA, M^a D. (1998). El género *Limonium* en la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana, Consellería de Medio Ambiente, 116 pp.
- EGUIBAR GALÁN M.A., SANCHIS IBOR C., MARCO SEGURA J.B. & MATEU BELLÉS J.F. (2007). El catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana. Aspectos metodológicos. Ingeniería del agua, vol.14, nº1, 23-35 pp.
- GOZÁLVEZ PÉREZ, V. (1977). El Bajo Vinalopó. Geografía Agraria, Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Valencia, 270 p.
- GRANT S.A., (1981). Sward components. In: Sward measurement handbook (Hodgson J., Baker R.D., Davies A., Laidlaw A.S., Leaver J.D., eds). British Grassland Society, Hurley, Maidenhead, Berkshire, UK. pp. 71-92.
- MATARREDONA COLL, E. (1985). Aplicación de la fotografía aérea en la cartografía de suelos. Anales de la Universidad de Alicante, Instituto Universitario de Geografía.
- MATARREDONA COLL, E. (1986). Cartografía de las asociaciones edáficas del Baix Vinalopó. Investigaciones geográficas, nº4, 97-127 pp.
- MATEU BELLÉS, J.F. & CUERDA BARCELÓ, J. (1978). Morfología cuaternaria de la costa entre l'Altet y el Cap de Santa Pola. Cauderno de Geografía nº23, Valencia, 63-82 pp.
- MELLENDEZ-PASTOR I. & NAVARRO-PEDREÑO J. (2009). Cambios de usos del suelo obtenidos mediante teledetección espacial en el

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

Clot de Galvany. Clot de Galvany, boletín informativo nº13, Ajuntament d'Elx.

LAGUNA LUMBRERAS, E.; CRESPO VILLALBA, M.B.; MATEO SANZ, G. y otros. (1998). Flora endémica rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana, Conselleria de Medio Ambiente, 443 pp.

LÓPEZ DELTELL, V. (en prensa 9-XII-2009). Humedales en alerta por desecación. Información.es, sección entorno.

PALAZÓN FERRANDO, S. & LARROSA ROCAMORA, J.A. (2002), El Clot de Galvany (Elche): un ejemplo de humedal amenazado por la expansión turístico-residencial, Universidad de Almería, 13 pp.

PÚLIDO –BOSCH, A.; RODRÍGUEZ ESTRELLA, T. (en prensa, 2008). Los acuíferos costeros y el suministro de agua de mar a las plantas desaladoras. Revista: Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 15 pp.

RAMOS SÁNCHEZ, A.J. (2002). Crónica ornitológica de 1999. La matruca, publicación de la asociación de amigos de los humedales del Sur de Alicante, nº12, 9-22 pp.

RAMOS SÁNCHEZ, A.J. (2003). Crónica ornitológica de 2000. La matruca, publicación de la asociación de amigos de los humedales del Sur de Alicante, nº13, 8-26 pp.

RAMOS SÁNCHEZ, A.J. (2004). Crónica ornitológica de 2001. La matruca, publicación de la asociación de amigos de los humedales del Sur de Alicante, nº14, 14-25 pp.

- RAMOS SÁNCHEZ, A.J. (2007). Crónica ornitológica de 2004. La matruca, publicación de la asociación de amigos de los humedales del Sur de Alicante, nº17, 26-39 pp.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. y ARNAIZ, C. (1983). Bioclimatología y vegetación en la Península Ibérica. Pré-rapport du Colloque de Bioclimatologie Méditerranéenne: III. Montpellier.
- ROBLEDANO, F.; CALVO, J.F.; ESTEVE, M.A.; PALAZÓN, J.A.; RAMÍREZ, L. y MAS, J. (1987). Tipología, conservación y gestión de las zonas húmedas del sureste español. Limnetica, vol.3, nº 2, 311-320 pp, Asociación Española de Limnología, Madrid.
- ROBLEDANO, F.; CALVO, J.F.; ESTEVE, M.A et al. (1991), Estudios ecológicos de los humedales costeros del sudeste español, inventario y tipificación. Anales de Biología nº 17, Universidad de Murcia, 153-163 pp.

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET

Notas

1. Dept. de Ecología
2. Dept. Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente
3. Unidad de Cartografía de los Recursos Naturales
4. IMEM, Universidad de Alicante

Dirección: Dept. de Ecología, Campus San Vicente. Ap. 99-E03080, Alicante, España. e-mail: rulete82@hotmail.com