MEDITERRANEA

SERIE DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS

2012 Época II N° 23

COMITÉ CIENTÍFICO:

G.U. CARAVELLO

S.G. CONARD

A. FARINA

A. FERCHICHI

L. TAÍQUI

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias

Revista electrónica anual

COMITÉ CIENTÍFICO:

S. G. CONARD. USDA Forest Service. Riverside. U.S.A.
A. FARINA. Lab. Ecología del Paisaje. Museo Historia Natural. Aulla. Italia.
A. FERCHICHI. I.R.A. Medenine. Túnez.
G.U.CARAVELLO. Istituto di Igiene. Università di Padova. Italia.
L. TAÏQUI. Université Abdelmalek Essaâdi. Tetuán. Marruecos.

COMITÉ EDITORIAL:

V. Peiró, J. Martín, A.Pastor-López, E. Seva.

DIRECCIÓN:

Eduardo Seva. Dep. Ecología. Fac. de Ciencias. Universidad de Alicante.

SECRETARÍA:

Victoriano Peiró (V.peiro@ua.es). Dep. Ecología. Universidad de Alicante.

EDITA:

Servicio de Publicaciones. Universidad de Alicante.
<http://publicaciones.ua.es>

CORRESPONDENCIA:

Departamento de Ecología. Fac. de Ciencias. Universidad de Alicante.
Ap. 99 - 03080 Alicante. España.
Teléfono de Secretaría: +34965903400, ext 2255
Fax: Rev. Mediterránea. Dep. Ecología. 96/5903464

I.S.S.N.: 0210-5004

Depósito Legal: A-1059-1984

Maquetación:

Marten Kwinkelenberg

Portada

Créditos

BELDA, A.; MARTÍNEZ, J.E.; ZARAGOZÍ, B.; FERRI, V. y
PEIRÓ, V.

**Estimación del hábitat del jabalí (*Sus scrofa*
Linnaeus 1758) en el Parque Natural de la Serra de
Mariola mediante Sistemas de Información
Geográfica..... 10**

BELDA, A.; MUNERA, P.; PEIRÓ, V.; MARTÍNEZ, J.E. & SEVA, E.

**Abundancia y distribución de especies
depredadoras sometidas a control en gestión
cinagética: Estudio de caso representativo de la
urraca (*Pica pica*) en la comarca de la Marina Baja 32**

BENARADJ, Abdelkrim; BOUAZZA, Mohamed &
BOUCHERIT, Hafidha

**Diversité floristique du peuplement à *Pistacia*
atlantica Desf. dans la région de Béchar (Sud-ouest
algérien)..... 66**

ENTRADI, E.

**Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale
(I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante 90**

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.; BELDA ANTOLÍ A.; BELLOD CALABUIG, F.J.; MARTÍNEZ-PÉREZ J.E. & MARTÍN CANTARINO, C.

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET 117

HACHEMI, Nouria; HASNAOUI, Okkacha; BENMEHDI, Ikram; MEDJATI, Nadjat et BOUAZZA, Mohamed

Contribution à l'étude de la thérophytisation des matorrals des versants sud des monts de Tlemcen (Algérie occidentale) 158

MARTÍNEZ-PÉREZ, J.E.; SEVA, E.; BELDA, A.; PASTOR-LÓPEZ, A. & MARTÍN, J.

Plan de restauración y conservación del humedal urbano de Calpe, Alicante (SE España) 181

SAAD, Karim; INTISSAR, Zarrouk; MAZGHOUNI, Mohamed; FERRI VILA, Vicente & MLAOUHI, Amor

Valoración energética de subproductos de palmera datilera 232

Plan de restauración y conservación del humedal urbano de Calpe, Alicante (SE España)

MARTÍNEZ-PÉREZ, J.E. (1); SEVA, E. (2); BELDA, A. (3);
PASTOR-LÓPEZ, A. (2) & MARTÍN, J. (2)

Resumen

Este estudio pretende profundizar en el conocimiento sobre el funcionamiento de pequeños humedales mediterráneos, en estado de degradación, que, por razones históricas y socioeconómicas, han quedado confinados en un espacio urbano, olvidando la importancia ambiental de estas anomalías hídricas positivas en espacios sometidos a déficit hídrico. Este tipo de humedales, como el de Calpe (Alicante), suelen localizarse en áreas costeras de alta densidad urbana, lo que supone un importante valor añadido desde la ordenación y gestión territorial, ya que contribuyen a mantener la conectivi-

dad ambiental a una escala mucho más amplia, funcionando como auténticos reservorios de biodiversidad.

Así, se ha llevado a cabo una aproximación holística, analizando el estado actual de la lámina de agua y del espacio circundante, donde se han incluido parámetros del medio físico, del medio biótico y los usos del suelo. Para ello se han combinado técnicas de muestreo de campo con el uso de GPS y sistemas de información geográfica (SIG). Una vez detectadas las amenazas, y estudiado el potencial ecológico del humedal, se ha desarrollado un plan de restauración y conservación de la zona con la pretensión de implicar a la población local para devolver a este espacio el protagonismo que merece. En definitiva, se pretende proporcionar las herramientas teóricas y técnicas necesarias para garantizar la conservación y gestión sostenible de los humedales costeros urbanos y sus recursos naturales.

Palabras clave: Recuperación ambiental, biodiversidad urbana, espacios abiertos urbanos, SIG.

Abstract

This study focus in depth in the knowledge of small mediterranean wetland functioning, in a degradation process, that, for

historical and socioeconomical reasons, have been confined inside urban areas

This study aims at deepening the knowledge on small Mediterranean wetlands in degraded state, which, for historical and socioeconomical reasons have been confined in an urban space, forgetting the environmental importance of these positive anomalies in water deficit areas. This type of wetland, such as Calpe (Alicante), usually found in coastal areas of high urban density, which represents significant added value from the territorial planning and management, contributing to maintain environmental connectivity in a wider scale, playing an important role as true biodiversity reservoirs.

Thus, we conducted a holistic approach, analyzing the current state of the water surface and the surrounding space, which included the physical, biotic and land use parameters. They were combined with field sampling techniques, using GPS and geographic information systems (GIS). Once threats were detected and analyzed, the ecological potential of the wetland, a restoration and conservation plan for the area was developed. The involvement of local people was essential to recover the relevance this space deserves. In short, this study provided theoretical tools and necessary techniques to en-

sure the conservation and sustainable management of urban coastal wetlands and natural resources.

Keywords: Environmental restoration, urban biodiversity, urban open spaces, GIS.

1. Introducción

Los humedales costeros mediterráneos, localizados en el sureste de la península Ibérica, son poco abundantes y están amenazados por la elevada presión antrópica, ya que se localizan en espacios litorales que han sufrido una importante transformación al adaptarse a la nueva realidad socioeconómica de las últimas décadas (Fernández *et al.*, 1992; Martínez-Pérez *et al.*, 2000; Peña *et al.*, 2007). Generalmente, se sitúan próximos a núcleos urbanos con una elevada densidad poblacional y una gran concentración de infraestructuras destinadas a responder a la demanda turística, que, en ocasiones, suponen un importante impacto ambiental en la costa (Fernández-Torquemada *et al.*, 2005). Aunque, frecuentemente, se ha centrado la atención en los aspectos bióticos de estas unidades ambientales, obviando valores socioeconómicos y culturales, es necesaria una concepción integral de estos espacios para alcanzar una mejora científica del conocimiento de los humedales (Eguibar-Galán

et al., 2007). Por esta razón, es necesario llevar a cabo adecuados planes de recuperación y gestión integral, ya que se consideran zonas de especial interés paisajístico, biótico, turístico, recreativo, etnológico, didáctico y científico (CMA, 2000).

1.1. Área de estudio

El humedal de Calpe, objeto del presente estudio, está constituido por las antiguas infraestructuras de una explotación salinera cuyos orígenes se remontan a la época romana. Esta antigua explotación, junto a los denominados «Baños de la Reina» (infraestructura equiparable a una actual piscifactoría), se dedicaba a la crianza, mantenimiento y salazón de pescados, lo que demuestra la importancia de este asentamiento (Jessen, 1927).

La historia ha remarcado la importancia de este enclave, estratégicamente situado en la costa mediterránea, convirtiéndose en punto de atracción para las distintas civilizaciones a lo largo del tiempo (Llopis, 1975). Esta atracción se ha hecho más patente en las últimas décadas del siglo XX donde la llegada de la economía del turismo de sol y playa ha contribuido al asentamiento de miles de familias de toda nacionalidad, consintiendo una nueva invasión pacífica y una importante

transformación territorial (Martínez-Pérez *et al.*, 2000; Peña *et al.*, 2007).

En cuanto a la evolución de la lámina de agua, el poblado íbero del Penyal ya conoció el humedal y muy probablemente, como se citaba en párrafos anteriores, la colonización romana le dio un uso de salinas. De forma intermitente se desarrolló esta actividad hasta un importante periodo de inactividad a finales del siglo XVIII, lo que motivó la aparición de fiebres terciarias (paludismo) entre la población. Tras este período, las salinas fueron puestas de nuevo en explotación a comienzos del siglo XX, funcionando sin interrupción hasta 1975, siendo abandonadas definitivamente en la década de los años 1980 (Box, 1987).

El abandono de esta zona, incluyendo algunos terrenos limítrofes, sumado a las condiciones de insalubridad derivadas de la falta de actividad y de los aportes del barranco de La Merced, llevó a la laguna a una situación de degradación, quedando confinada, hasta sus propios límites hidráulicos, entre edificios de viviendas, hoteles e infraestructuras viarias. Ante este escenario, las autoridades municipales se decidieron a calificar esta laguna bajo una figura de protección de ámbito local, siendo mantenida desde entonces en sus constantes hidrológicas y sanitarias, a través de un suminis-

Plan de restauración y conservación del humedal urbano de Calpe, Alicante (SE España)

Mapa 1. Zona de estudio

tro intermitente de agua marina mediante bombeo, lo que ha supuesto la conservación de las poblaciones de organismos más característicos de este tipo de zonas húmedas hasta la actualidad.

Además, este espacio del municipio de Calpe muestra un privilegiado emplazamiento, enmarcado entre los retazos de sistema agrícola tradicional, convirtiéndolo en un óptimo candidato para la conservación y puesta en valor del patrimonio agrícola tradicional en esta comarca. Así, la combinación de estos elementos naturales y agrícolas, junto a la presencia de la lámina de agua, configuran un espacio de alta diversidad paisajística, lo que se traduce en un área altamente diversa.

1.2. Importancia de las zonas húmedas litorales

Los depósitos de aguas someras, cercanos al litoral, en las provincias meridionales de la península Ibérica, constituyen unos de los ambientes de mayor riqueza florística y faunística de los ecosistemas mediterráneos. Así, la mera presencia de una tabla de agua les otorga la cualidad inigualable de poder crear gran diversidad de ambientes a un lado y otro del plano divisorio de su superficie, al que acuden organismos no necesariamente ligados a este medio. Por esta razón, desprenden un elevado valor ecológico, resultando de especial interés

para la estancia, cría, reproducción y migración de numerosas especies orníticas, dada la proximidad de los complejos marismos estacionarios y otras zonas húmedas prelitorales (Adam, 1990; Allen & Pye, 1992; Gómez *et al.*, 1998).

En la provincia de Alicante, debido a su desigual orografía en sus mitades meridional y septentrional, los humedales de mayor calibre se sitúan entre los sedimentos de los ríos Vinalopó y Segura, en la vega que se abre desde el cabo de Santa Pola hasta su frontera con Murcia. Son los espacios que quedan por rellenar de los aportes de ambos cauces hasta la barra arenosa que unió los salientes Torrevieja-Santa Pola. Corresponden a espacios con categoría de parques naturales de la Comunidad Valenciana, los de lagunas de Torrevieja-La Mata, Salinas de Santa Pola y El hondo de Crevillente-Elche; a los que habría que sumar el paraje municipal de El Carabassí, incluido asimismo en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.

Los humedales costeros pueden variar desde los que contienen agua dulce, hasta los ambientes más hipersalinos cuya salinidad supera con creces a la del propio mar, ya que la evaporación en estas masas suele alcanzar valores altos por la temperatura que alcanzan sus aguas al ser ambientes someros de muy escasa profundidad. De ahí que muchos de

ellos han sido y siguen siendo utilizados para la extracción minera de las sales marinas, como es el caso de Santa Pola o de Torrevieja en el mismo territorio de la provincia de Alicante. Este es el caso de la laguna de Calpe, producto del cerramiento por restingas de levante y de poniente que unieron el continente a la prehistórica isla del Penyal y dejando la depresión central alimentada por la extensa cuenca de recepción.

A pesar del abandono de la actividad salinera en la década de los años 1980, la laguna conserva actualmente una interesante riqueza biológica y paisajística, tanto en lo que respecta al medio acuático como al entorno terrestre. Así, es necesario destacar la presencia de una importante avifauna de palmípedas, sin menosprecio de una flora de más de cien especies en las inmediaciones que hoy día siguen manteniéndose intactas, donde también se encuentran efectivos de fauna típica mediterránea que aportan un cierto interés biótico a un entorno altamente antropizado por su especialización turística.

Es necesario recordar la fragilidad de este entorno frente a la acción directa o indirecta de agentes externos, ya que su confinamiento supone un nivel de dependencia bastante elevado, pudiendo darse procesos (Zedler y Leach, 1998) que

pueden influir negativamente en el funcionamiento del sistema. De este modo, es necesario vigilar: la modificación del régimen hídrico, mediante el control de los flujos de entrada y salida del agua; los procesos de erosión del suelo, que pueden contribuir en la colmatación del vaso de la laguna; la introducción de especies invasoras, que favorecen la pérdida de diversidad local; la contaminación directa de la lámina de agua por escorrentía superficial o la degradación del entorno por fragmentación del hábitat y una excesiva presión humana.

A pesar de los posibles problemas e impactos, la charca presenta un excepcional interés ecológico, ya que unas mínimas medidas de manejo y gestión potenciarán su capacidad para generar un espacio idóneo donde acoger distintas formas de vida, contribuyendo a incrementar la calidad ambiental de la zona y actuando como elemento complementario del espacio protegido del Penyal d'Ifach, permitiendo compatibilizar actividades de restauración ecológica, con investigación y, por supuesto, con el recreo ciudadano y la educación ambiental (Zedler y Leach, 1998).

1.3. Caracterización del medio biótico y los usos del suelo

La salina y su entorno, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, es un sistema de origen antrópico que aprovecha la configuración topográfica local. Este tipo de explotaciones, próximas al litoral, no produce degradaciones irreversibles en el medio, sino que mantiene un cierto equilibrio y consonancia con el mismo, llegando a compatibilizar la productividad de un área con la conservación de los valores naturales. Además, la zona se ve enriquecida por la heterogeneidad de ambientes que proporciona la presencia de manchas de vegetación natural y algunas parcelas de arbolado de agricultura de secano, arrojando al conjunto una interesante diversidad paisajística.

La consolidación de la laguna como humedal supone la aparición de un medio lleno de vida en constante evolución, donde es posible encontrar numerosas especies de flora y formaciones vegetales, tal y como se recoge en el análisis botánico de la zona.

A grandes rasgos, el dominio de la biomasa flotante y fijada al sustrato de macrófitos y clorófitos, corresponde a especies de los géneros *Cladophora*, *Enteromorpha*, *Chaetomorpha* y a la fanerógama acuática *Ruppia maritima* subsp. *rostellata*.

Las ovas flotantes de *Cladophora* y *Enteromorpha* deambulan de una parte a otra de la laguna siempre en la dirección de los vientos dominantes, es decir, en los extremos NE y S-SW de la misma, mientras que la distribución de la fanerógama *Ruppia* ocupa casi con exclusividad los dos tercios meridionales de la laguna huyendo de los medios más eutrofizados. Las ovas de algas clorofíceas forman agregados en superficie por las burbujas de gas y oscilan en profundidad según las horas del día; su distribución dependiente de los vientos puede cambiar claramente el aspecto global de la laguna de un día a otro, condicionar el comportamiento térmico de la laguna y direccionar el asentamiento de poblaciones de peces y aves dependientes tróficamente de estas masas.

Por otra parte, también es posible encontrar gran cantidad de elementos de fauna que, aunque propios del entorno mediterráneo en su mayoría, no dejan de aportar un cierto interés biótico a un entorno altamente antropizado por su especialización turística. Este interés biótico se incrementa exponencialmente en el apartado de las aves, destacando, por su importancia e interés científico, aquellas especies ligadas íntimamente a la lámina de agua.

1.3.1. Flora y vegetación

Para llevar a cabo una buena restauración de las salinas y su entorno es necesario considerar tanto los factores bióticos como abióticos y las relaciones que se producen entre éstos. Un buen indicador del éxito de la restauración es la expansión de la cubierta vegetal configurada por las especies que forman parte de la comunidad vegetal de los ambientes salinos (Grismer *et al.*, 2004).

El paisaje vegetal está determinado especialmente por parámetros medioambientales y por la actividad del hombre. La vegetación antropogénica corresponde a las necesidades económicas y sociales (cultivos y ornamentales) y derivada de las actividades del ser humano (vegetación nitrófila). Por otra parte, la vegetación natural ha sufrido una considerable regresión con el paso del tiempo (Barber, 1996, 2007; Pérez, 1997).

Se ha elaborado un catálogo florístico a partir de los muestreos de campo realizados en el área de estudio. Se han escogido las especies vegetales que sirven como indicadores de los diferentes pisos bioclimáticos, series de vegetación o por su valor de endemidad. Los transectos, realizados preferentemente en primavera, han cubierto la totalidad del área de estudio, registrando un total de 173 especies durante el

Plan de restauración y conservación del humedal urbano de Calpe, Alicante (SE España)

período prospectado, destacando por su interés algunas de ellas (Tabla 1).

Nombre científico	Nombre común	Protección
<i>Barlia robertiana</i> (Loisel.)Greuter		III
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.)N.E.Br.		VI, VII
<i>Centaurea rouyi</i> Coincy		UICN:LRlc; CONS:BS,MC,MR,ENP
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmito	III
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. F.)Asch. & Graebn.	Plumeros	VI, VII
<i>Erucastrum virgatum</i> (J. & C.Presl)C. Presl subsp. <i>branchycarpum</i> (Rouy) Gómez– Campo		UICN:LRlc; CONS:BS,MR,ENP
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Eucalipto	VII
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.)Roth		VI, VII
<i>Juncus acutus</i> L.	Junco redondo	LR
<i>Lavandula dentata</i> L.		III
<i>Lavandula multifida</i> L.		III
<i>Limonium angustebracteatum</i> Erben		
<i>Limonium parvibracteatum</i> Pignatti	Saladilla rosa	VUL; UICN:LRnt; CONS:PG,PI,MR,ENP
<i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr.		
<i>Magnolia grandiflora</i> L.		
<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.		VII
<i>Nicotiana glauca</i> R.C. Graham	Tabaco moruno	VII
<i>Ophrys apifera</i> Huds.		
<i>Ophrys speculum</i> , Link		
<i>Opuntia maxima</i> Mill.	Chumbera	
<i>Orchis collina</i> Soland. Ex A.Russell		Ila

<i>Orchis papilionacea</i> subsp. <i>grandiflora</i>		Ila
<i>Phoenix</i> sp.	Palmera	VII
<i>Robinia pseudacacia</i> L.	Falsa acacia	VI, VII
<i>Teucrium capitatum</i> L. subsp. <i>capitatum</i>		III
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Tomillo	III
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Yuca	VII

Tabla 1. (Según el Catálogo de Flora del Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana: 1) Anexo Ila: En peligro de extinción; 2) Anexo Ilb: Vulnerables; 3) Anexo III: Protegidas no catalogadas; 4) Anexo IV: Con protección parcial; 5) Anexo VI: Prohibición de implantación; 6) Anexo VII Exóticas)

1.3.2. Usos del suelo y elementos de interés

La adecuada planificación de la zona requiere una detallada cartografía de los usos del suelo actuales, empleando como base los ortofotogramas del Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) del año 2005 (Mapa 2). La capa de información generada, compatible con ArcGIS®, muestra un total de 17 categorías de usos del suelo, diferenciando entre tipos de vegetación y aprovechamientos (Tabla 2). De manera complementaria, además de los usos del suelo, también se han considerado los elementos arbóreos y arbustivos del área de estudio. Así, mediante el uso de GPS, se han posicionado

Plan de restauración y conservación del humedal urbano de Calpe, Alicante (SE España)

todos los pies de vegetación, tanto exótica como autóctona y cultivada, generando una nueva capa SIG con un total de 24 especies y 746 contactos. La presencia de algarrobo, almendro, olivo e higuera denota el pasado agrícola de la zona, contrastando con eucaliptos, palmeras y mimosas, además de elementos propios de saladas, como el taray, mostrando una historia vegetal un tanto agitada.

Usos del suelo en la Laguna de Calpe	
Áridos	Puntos de acumulación de áridos y otros materiales empleados en la construcción por vertido incontrolado.
Baldío	Lugares próximos a los principales viales, con escasa o nula vegetación, elevada compactación del suelo y algunos vertidos de escombros.
Infraestructuras turísticas	Se trata de las instalaciones ocupadas por los campings, con especies ornamentales y algunas especies exóticas.
Campo abandonado	Zonas abandonadas de cultivo de secano donde aparecen algunos pies de las especies cultivadas y la vegetación ruderal colonizadora.
Carrizal	Áreas deprimidas y con el nivel freático próximo a la superficie donde dominan las formaciones de carrizo (<i>Phragmites australis</i>).
Eucaliptos	Se corresponde con zonas arboladas que presentan como especie dominante el eucalipto (<i>Eucalyptus camaldulensis</i>).
Finca	Espacios con una pequeña vivienda y su parcela. La mayoría de especies en estas zonas son cultivos o especies ornamentales.
Juncal	Zonas deprimidas ocupadas por juncos (<i>Juncus acutus</i> , <i>J. Maritimus</i> , <i>J. Subulatus</i> y <i>Scirpus holoschoenus</i>) y algunas especies halófilas.

Laguna	Se reduce a los límites naturales del vaso y mantiene una lámina de agua permanente por los aportes procedentes del bombeo.
Matorral arbolado	Matorral típico mediterráneo intercalado con especies arbustivas, entre las que destacan el palmito y el lentisco, y algunos árboles dispersos.
Matorral claro	Áreas ocupadas por matorral de escasa cobertura vegetal. Suelen aparecer especies propias de suelos descalcificados como <i>Cistus</i> sp. y <i>Erica</i> sp.
Matorral denso	Se trata de zonas de matorral termomediterráneo con una elevada cobertura vegetal.
Pinar	Espacios ocupados por el arbolado donde domina el pino carrasco (<i>Pinus halepensis</i>).
Saladar	Está formado por el cordón que rodea a la laguna y que presenta una vegetación influenciada por el elevado grado de salinidad ambiental.
Vegetación nitrófila	Próxima a las vías de comunicación y de depósito de escombros. Aparecen especies nitrófilas y destacan gramíneas, compuestas y quenopodiáceas.
Vías de comunicación	Compuesta por los viales de comunicación que rodean o atraviesan el área de estudio.
Viñedo	Son zonas en las cuales se practica, de forma puntual, el cultivo de la viña.

Tabla 2. Principales cubiertas y usos del suelo descritos en la zona de estudio.

Gracias a la generación de esta base de datos georreferenciada es posible proceder a la localización y eliminación de los pies de especies exóticas y de la vegetación nitrófila, permitiendo la recuperación de la vegetación natural en algunos de los puntos de este entorno. Así, la zona puede convertirse

Plan de restauración y conservación del humedal urbano de Calpe, Alicante (SE España)

Mapa 2. Usos del suelo en el entorno de la laguna de las Salinas de Calpe

en un lugar emblemático y caracterizado por su elevada calidad ambiental, con interesantes tasas de riqueza y diversidad de ambientes, pudiendo convertirse en una referencia de gestión de áreas naturales integradas en espacios urbanos.

1.3.3. *Fauna*

A pesar de constituir un paraje embutido en el entramado urbanístico de Calpe, la laguna todavía posee valores naturales de suficiente interés como para poder albergar una nómina bastante completa de vertebrados terrestres. Su apertura hacia el N y NW, entre construcciones de baja densidad y pasillos seminaturales, así como la permanencia de la misma lámina de agua, sirven de atractivo a la mayoría de pequeños y medianos vertebrados.

Anfibios, reptiles y mamíferos típicos mediterráneos componen la comunidad faunística del entorno de la laguna, enriquecida por la proximidad de parches de vegetación natural y sistemas agroforestales activos o en proceso de colonización postabandono.

Al margen del interés que puedan suscitar las especies puramente terrestres, es necesario poner de manifiesto la importancia de la avifauna presente en la zona. Por esta razón, se ha llevado a cabo el catálogo completo de aves que se

Plan de restauración y conservación del humedal urbano de Calpe, Alicante (SE España)

Mapa 3. Distribución del número de individuos de avifauna censados.

corresponde con un ciclo anual. Para facilitar el censo se ha establecido una rejilla de referencia sobre la laguna (Mapas 3 y 4) y su entorno, haciendo salidas de campo cada 15 días y detectándose alrededor de 125 especies, entre generalistas y propias de humedales. Con la información obtenida en campo se ha podido estimar el número de individuos y el número de especies en cada una de las celdas de muestreo.

Entre los elementos de la avifauna, detectados en las salinas de Calpe, cabe destacar la presencia de cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*), garceta común (*Egretta garzetta*) o garza real (*Ardea cinerea*). Una de las especies más llamativas es el flamenco (*Phoenicopterus ruber*), constituyendo uno de los grandes atractivos de las salinas, aunque no se reproduce en ellas. Por otra parte, las observaciones de ánades invernantes han sido muy escasas y se han reducido a pequeños grupos de ánade silbón (*Anas penelope*), pato cuchara (*Anas clypeata*) y pato colorado (*Netta rufina*), durante el otoño de 2007.

Algunas de las especies más comunes en la gran mayoría de humedales, presentes durante todo el año, y que se reproducen en la zona de estudio a pesar de requerir aguas menos salinas, son la gallineta común (*Gallinula chloropus*) y la focha común (*Fulica atra*), ya que los episodios de lluvias

Plan de restauración y conservación del humedal urbano de Calpe, Alicante (SE España)

Mapa 4. Distribución del número de especies de avifauna censadas.

torrenciales de 2007 modificaron el grado de salinidad de la laguna.

La cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*), a pesar de ser una especie migratoria, ha podido observarse en otoño-invierno, gracias a la bondad del clima local. Suelen criar distribuidas por la orilla norte, ya que es la menos perturbada por el paso de personas.

Otra de las especies de interés, presentes en la zona, es la gaviota de audouin (*Larus audouinii*), que, a pesar de estar globalmente amenazada, se va recuperando poco a poco y se puede observar durante todo el año, concentrándose a final de primavera. También es posible encontrar carricero común (*Acrocephalus scirpaceus*), el chorlitejo patinegro (*Charadrius alexandrinus*) y diferentes especies de lavandera (*Motacilla* sp.).

En las zonas de arbolado, del entorno de la laguna, es posible encontrar, a lo largo de todo el año, la paloma torcaz (*Columba palumbus*), la tórtola turca (*Streptopelia decaocto*), el mirlo común (*Turdus merula*), el ruiseñor bastardo (*Cettia cetti*) o el buitrón (*Cisticola juncidis*), junto a otras especies de carácter mediterráneo.

2. Justificación

La dinámica socioeconómica del litoral español, en las últimas décadas, ha contribuido a un fuerte desarrollo del ámbito urbano residencial, enfocando la especialización del territorio hacia la demanda de asentamientos y servicios turísticos. Esto ha provocado una importante limitación en el adecuado equilibrio entre lo urbano, lo agrícola y lo natural, creando desequilibrios territoriales difíciles de salvar. Por esta razón, cualquier iniciativa encaminada a recuperar y conservar espacios que ostentan importantes valores naturales y culturales, asociados a un territorio intensamente antropizado, se hace importante con el fin de conservar su riqueza ambiental, al tiempo que se proporciona un interesante valor añadido a la zona donde se ubican.

Es necesario restaurar los hábitats originales para devolverles la funcionalidad ecológica, aumentando su valor frente a la ciudadanía. Para ello, se recurre a los objetivos generales del Plan Estratégico del Convenio de Ramsar (1997-2002) y de la Estrategia sobre Humedales Mediterráneos (Venecia 1996), que se resumen en un incremento del conocimiento sobre los humedales para garantizar su protección a través de una adecuada gestión, implicando a instituciones, organismos y entidades, tanto gubernamentales como no guber-

namentales, donde se incluye a las entidades locales y el sector privado.

La correcta gestión de este tipo de espacios que, aunque parcialmente degradados, presentan altos valores naturales, culturales y paisajísticos se hace imprescindible con el fin de conservar dichas riquezas, además de ser la base para una nueva dinamización sociocultural y ambiental del municipio, complementaria del espacio protegido del Penyal d'Ifach.

2.1. Metodología

Con objeto de llevar a cabo un análisis integral de la calidad del agua, ya que de esta depende la recuperación funcional del sistema, se ha realizado una serie análisis de muestras del agua y del sedimento, caracterizando también el perfil térmico de la laguna y, desde un punto de vista biótico, la flora y fauna terrestres que forman parte del entorno. Todos los elementos, incluyendo medio físico y biótico, se han integrado, a través de un sistema de información geográfica, en diferentes capas temáticas.

2.1.1. Muestras de agua y sedimento

En el muestreo ha primado la distribución espacial de las sondas, manteniendo la localización a lo largo del tiempo, reali-

zándose un registro de datos continuado desde febrero de 2007 a febrero de 2008. Se han tomado muestras en diversos momentos del año, procurando la estabilidad climática, consiguiendo unas condiciones ambientales homogéneas para detectar los efectos de la evaporación, la posible descarga de contaminantes, los picos de productividad en flora y fauna, además de la variación normal de la temperatura del agua.

Las muestras de agua se tomaron a una profundidad de 15 cm, en los mismos puntos donde quedaron instalados los sensores de temperatura, recogiendo 500 ml de agua en frasco estéril y hermético para el posterior análisis. Las técnicas de análisis utilizadas han sido las de espectrofotometría de absorción atómica, la de volumetría y las de IPC para elementos minoritarios. Parte del contenido sirvió para el análisis bacteriológico en cultivo sobre placa, por la posible presencia de organismos patógenos como los coliformes, enterococos o estreptococos, síntomas evidentes de cualquier fuente posible de contaminación orgánica.

También se llevó a cabo una toma de muestra de sedimentos en los mismos puntos a los que se refiere la toma de muestras de agua con el fin de detectar elementos nocivos (metales pesados fundamentalmente) y evaluar la materia orgánica presente en el primer nivel del sustrato (5 cm).

2.1.2. Perfil térmico del agua

Finalmente, se instalaron unos sensores de temperatura del tipo TidbiT v2 temp de Onset Computer Corporation® distribuidos por la laguna. Los sensores se programaron para el registro cada 10', sujetos con bridas a unas estacas de acero inoxidable. La estabilidad del estacado sobre diferentes fondos de arena y fango ha hecho que perduren en su posición pese a eventos tan dramáticos del clima como las riadas del 12 de octubre de 2007, que elevaron el nivel de la laguna hasta 1,5 m sobre el habitual.

La descarga de los datos permite, por una parte, el graficado de dichos registros para el posterior cartografiado de la distribución de las isotermas. Por otro lado, permite comprobar el comportamiento térmico de la masa de agua por sectores, así como la posible comparación con los datos diarios de observatorio del Parque Natural del Penyal d'Ifach. Los registros finalizaron cuando cumplió la anualidad completa, durante el mes de febrero de 2008, momento en el que se empezaron a tratar los datos.

2.1.3. Muestreos de flora y fauna

De manera complementaria, a la caracterización de la lámina de agua, se ha realizado un exhaustivo muestreo de la flora

en primavera, implementando un censo de especies para calibrar el impacto de las invasoras en el área de estudio.

Por otro lado, en lo relativo a la fauna que frecuenta este espacio, semanalmente se ha efectuado un censo de aves en el territorio del parque municipal y quincenalmente se han montado redes japonesas para la captura-recaptura de especímenes, así como su anillamiento. El resto de vertebrados terrestres también ha sido analizado, para conocer la composición de la comunidad faunística, a través de muestreos de presencia mediante el seguimiento de huellas y rastros.

2.1.4. Elaboración de capas de cartografía SIG

Se han elaborado una serie de capas temáticas en las que se recogen las variables del medio físico, así como una parte importante de las variables descriptivas del medio biótico y los usos del suelo. Esta serie cartográfica ha sido incorporada a un SIG (Sistema de Información Geográfica) a fin de obtener una base de datos que contribuya a la toma de decisiones para una adecuada planificación y gestión del entorno. El desarrollo del SIG se centra en el uso de las aplicaciones ArcGIS® e Idrisi®, utilizando como base cartográfica la información elaborada por el ICV (Instituto Cartográfico Valenciano)

y los fotogramas de 1956 (vuelo americano) y del año 2005 del ICV, con las respectivas escalas de 1:33.000 y 1:5.000.

La superficie delimitada para la realización del estudio sobrepasa el área de la laguna, ya que se hace imprescindible la adecuación y gestión del entorno más próximo a la lámina de agua por las repercusiones directas sobre la misma.

A modo de síntesis, las decisiones sobre la planificación de la zona también han sido plasmadas sobre la cartografía con objeto de prever los efectos que tendrá este plan sobre el terreno, mostrando las modificaciones e intervenciones que deberían ser incorporadas.

3. Plan de restauración y conservación

La elevada presión urbanística que padece el municipio de Calpe se traduce en una importante escasez de zonas verdes en la localidad. A pesar de esto, las salinas y su entorno no se han visto favorecidas como espacio destinado al uso recreativo. Por esta razón, y gracias a una situación privilegiada de las salinas, en las proximidades del Parque Natural del Penyal d'Ifach, así como su catalogación en el listado de zonas húmedas valencianas, aparecen nuevas posibilidades de desarrollo mediante la restauración y recuperación de un espacio degradado, al tiempo que se abre la posibilidad de

fomentar la creación de un espacio para la investigación aplicada y el desarrollo de estrategias de conservación adecuadas a la realidad del medio.

En el caso que nos ocupa, el proceso parte de la identificación muy precisa de los problemas asociados a un espacio que es resto de la actividad urbanística de un núcleo humano de gran importancia. Dentro de un marco lógico, y definidas las actuaciones particulares en cada sector y en cada fase de desarrollo del mismo, cabe también el permitir la participación activa de los actores públicos y privados involucrados en la gestión del espacio protegido. Asimismo, la introducción de indicadores objetivos, permitirá cuantificar hasta qué punto se alcanzan los objetivos previstos y sentar las bases para un eficaz seguimiento y una evaluación precisa de las medidas a acometer en el futuro.

Este tipo de proyectos de planificación se centra en la gestión sostenible de la zona húmeda, estableciendo una serie de pautas de manejo que deben centrarse en: 1) Asegurar la calidad del agua, 2) Controlar los usos, presiones e impactos sobre la zona y 3) Recuperar la configuración paisajística del entorno, dando cabida a las especies más representativas y a los usos agrícolas tradicionales. Esto supone mantener, restaurar y recuperar buena parte de los elementos que ma-

tizaban este paisaje hace unas décadas, proporcionándole un importante valor añadido desde el punto de vista de la conservación y la biodiversidad.

3.1. Actuaciones sobre la lámina de agua

El humedal de las Salinas de Calpe está sometido a importantes presiones, sobre todo por encontrarse insertado en un espacio urbano consolidado y ocupar una escasa superficie. Así, la zona aparece como una auténtica isla de naturaleza, donde la presencia continuada de agua y una elevada heterogeneidad paisajística favorecen el asentamiento de especies de gran interés botánico y faunístico.

La recuperación y puesta en valor del humedal y el entorno de las Salinas de Calpe debe ser un objetivo prioritario para el municipio, pasando de una situación de alto riesgo de degradación a un nuevo estado que lo convierta en centro de atención e interés ambiental, caracterizado por un uso responsable, orientado hacia la conservación y difusión de los valores naturales, implicando, en todo momento, tanto a la población residente en su área de influencia, como a la población flotante.

3.1.1. Red de saneamiento e itinerario principal

El sistema de saneamiento (Mapa 5) tiene por objeto evitar el aporte de aguas procedentes de las precipitaciones, que recorren las superficies urbanizadas y pueden arrastrar todo tipo de sustancias contaminantes a la laguna y zonas aledañas. Se han detectado diversos puntos de entrada de aguas sucias que deben ser eliminados, principalmente los procedentes de los viales del lado sur y suroeste y la entrada sureste. Así, se propone, entre otras acciones: 1) la construcción de un circuito perimetral de tubería de desagüe con salida al sur hasta el mar; 2) el sellado de las entradas directas actuales, procedentes de lo acumulado en las precipitaciones de las principales avenidas, evitando de esta forma la entrada de aguas sin control y 3) sobre la trayectoria de este encauzamiento cubierto, la construcción de un itinerario didáctico.

Mapa 5. Modificación de topografía, saneamiento e introducción de elementos de restauración

3.1.2. Entradas y salidas de agua

Esta laguna constituye un sistema acuático de carácter dinámico sometido a una fuerte evaporación que requiere un caudal permanente para mantener las poblaciones de organismos que se sostienen sobre la misma naturaleza de humedal. Por esta razón, es necesario implantar un sistema de control de flujos y de nivel. Así, se propone la construcción de una estación de bombeo para entrada de agua marina, procedente de la playa de La Fossa, y con salida en el Cantal Roig a través de un colector en profundidad para evitar molestias a la población.

Con esta actuación se pretende mantener, de manera constante, el nivel de la lámina de agua, así como su renovación, lo que implica el establecimiento de una estación de aforo y unos puntos de medida de nivel sobre la masa de agua. Son condiciones necesarias para la permanencia de las comunidades vegetales y animales asentadas en el medio.

3.1.3. Eliminación de lodos y nueva topografía sumergida

Dada la actual topografía bajo la lámina de agua, y considerando la continua acumulación de depósitos arrastrados y de la materia orgánica acumulada por la actividad de las comunidades vivas, se pretende facilitar la circulación del agua,

mediante la supresión de algunos de los antiguos resaltes de separación entre balsas de evaporación de la antigua actividad salinera. Por otra parte, también se hace necesaria la extracción de los grandes depósitos de lodos con el fin de diversificar ambientes relativos a mayor o menor profundidad del agua.

3.1.4. Isletas y posaderos

La actuación anterior se ha de completar con el diseño y construcción de diversos elementos espaciales no sumergidos en el interior de la laguna (Mapa 5). En concreto, se proponen dos o tres islotes de una superficie aproximada de 30 m² cada uno, como área de reposo y reproducción para algunas de las especies que frecuentan la laguna. Esta acción se combinaría con un gradiente de profundidades y la instalación de posaderos para aves de mediano a gran tamaño, aprovechando los resaltes que resten de las antiguas balsas de decantación.

3.2. Actuaciones sobre el contorno de la laguna

3.2.1. Retranqueo de elementos urbanísticos e infraestructuras básicas

Actualmente, las aceras de los viales que circundan el humedal están en contacto directo con la lámina de agua. Es

necesario crear un espacio intersticial entre estas vías y la laguna, introduciendo un corredor de perfil irregular y al mismo nivel en el que sitúa ahora mismo la propia acera, sobre el que se establecerá cierto tipo de vegetación acompañante. Básicamente, el material para realizar este perfil tendrá su origen en los volúmenes dragados en la zona B (Mapa 6). Así, se propone la reducción de la explanada de la zona B, con el fin de dar continuidad a los perfiles generados en las zonas contiguas denominadas con una letra A.

Por otro lado, también es necesaria la sustitución de los tendidos de media tensión, que cruzan parte la zona de estudio, por otros que bordeen este espacio, así como la eliminación completa de las vallas publicitarias en muchos de los puntos del borde de la laguna.

3.2.2. Instalación de pantallas sonoras

Con el fin de aislar la laguna de la actividad propia de los viales próximos, se propone la instalación de unas pantallas sonoras con una disposición en módulos imbricados, es decir, con interrupciones solapadas que, además de evitar la sensación de barrera, permitan la circulación de personas interesadas en visitar este entorno y, por ejemplo, observar la

fauna. El material utilizado permitirá la integración de la obra en el entorno, evitando las pantallas de obra dura.

3.2.3. Zonas de especial protección y salinidad para *Artemia salina*

Además de los contingentes de avifauna, propia de estas zonas húmedas, es necesario planificar la recuperación del crustáceo *Artemia salina*, base de la alimentación de muchas especies de la laguna, que ha sido desplazado con el tiempo por la especie análoga pero invasora *Artemia franciscana*.

Dado que las poblaciones de esta especie requieren aguas bastante someras y con una concentración salina que dobla la del agua del mar, se propone el diseño y construcción de una balsa de evaporación de forma rectangular (Ω) de escasa profundidad (máximo de 30 cm.), fondo uniforme y cerrada por completo con márgenes hechos con el mismo material extraído de la zona C (Mapas 5 y 6). Es recomendable que se cierre el recinto en primera instancia y con posterioridad se efectúe el relleno de la zona en evitación de una turbidez extendida al conjunto de la laguna, lo que provocaría daño a la biota en general de la misma.

Plan de restauración y conservación del humedal urbano de Calpe, Alicante (SE España)

Mapa 6. Planificación general del espacio ocupado por las salinas de Calpe

3.2.4. Eliminación de las zonas de vertido de residuos

La zona marcada como C (Mapa 6) es producto del vertido continuado en otro tiempo de escombros en el intento de aterrizar parte de la laguna y hoy cubierto por una comunidad de halófilos muy homogénea y banal junto a bastantes especies acompañantes de nitrófilas y ruderales. Todo ello se mezcla en algunos tramos con detritos actuales, lo que hace de este enclave un territorio propicio a la restauración, ya que es aledaño al espacio que podría ocuparse por un centro de interpretación (i). Parte de su desestructuración tendrá como destino la nivelación y elevación de la charca de *Artemia* (Ω), delimitada en el Mapa 5, y la zona de playa planeada en la zona E (Mapa 6).

3.2.5. Creación de zonas de playa en zona E

Con el fin de reactivar la presencia de aves limícolas en la laguna, se hace preciso dotar de un ambiente propio en este sentido, por lo que se propone el recrecimiento de los fondos, ya bastante someros, en la zona designada como E (Mapa 6). Los materiales para la construcción del ambiente de playa limo-arenosa serán los procedentes de las zonas B y C, más los que deban aportarse y cuyo origen sea ajeno a los ambientes de la propia laguna.

El resto del contorno interno de la laguna no requiere actuaciones, ya que las comunidades de *Phragmites* se encuentran en buen estado y dan refugio a ciertas poblaciones de palmípedas. Ni siquiera el flujo continuo de agua del mar procedente de la playa de La Fossa dañará ostensiblemente el carrizo pues en la actualidad la masa de agua mantiene concentraciones salinas muy similares, incluso superiores en determinadas circunstancias a la del mar.

3.2.6. *Eliminación de especies invasoras*

El medio terrestre que rodea la lámina de agua, más concretamente los sectores Este y Norte, se encuentran en un estado de conservación y naturalización poco deseable desde la restauración ambiental. Los pies de las especies arbóreas y arbustivas del matorral y bosque mediterráneo, se mezclan con pies de especies invasoras procedentes de escombros y evadidas de jardinería, especies por lo general agresivas, buenas colonizadoras, oportunistas de estos ambientes ya deteriorados por otras causas. Por esta razón, se propone la eliminación de las mismas mediante métodos de aclareo del entramado mixto de vegetación para facilitar el desarrollo posterior del matorral y bosque más acorde con el dominio bioclimático y facilitar asimismo la calidad de los itinerarios de carácter florístico que se especifiquen.

3.2.7. Recuperación y restauración del sistema agrícola tradicional

Para la recuperación de todo el sistema es necesario rehabilitar las parcelas agrícolas, dedicadas a secano tradicional, mediante el empleo de técnicas integradas que aseguren la permanencia de la calidad de la lámina de agua. Esto supone el empleo de técnicas y productos propios de la agricultura ecológica, consiguiendo la diversificación de ambientes, de cubiertas y de asociaciones vegetales manteniendo la diversidad de los hábitats que ya existen. En concreto son de especial interés las formaciones de matorral mediterráneo que recubren la pequeña zona alomada próxima a la tabla de agua en su lado norte, y flanqueada por restos de la agricultura de frutales abandonada.

De forma concatenada a la actuación anterior conviene, por su importancia cultural, la recuperación, mediante restauración, de aquellas estructuras en piedra seca ligadas a la actividad agrícola, tales como taludes de abancalamiento, muretes y lindes de caminos, albercas, canalizaciones, partidores y sistemas de elevación si los hubiese.

3.2.8. Creación de un centro de interpretación

La localización de las Salinas en el espacio urbano requiere un importante proceso de concienciación ligado a un programa de educación ambiental, ya que la ciudad se caracteriza por un significativo déficit en espacios verdes y de esparcimiento al aire libre. Estas zonas, sin embargo, son cada vez más buscadas y valoradas por la población, ya que el contacto con lo natural es una actividad creciente y necesaria para el desarrollo de la persona.

Según lo expuesto, sería necesario crear un espacio multifuncional, complementario al propio espacio natural, en el que se genere un nuevo punto de atracción para el ocio y el esparcimiento de la población general, pero que, al mismo tiempo, cubra buena parte de las necesidades de sensibilización ambiental en un entorno urbano, favoreciendo las tareas de investigación y divulgación. Este centro sería complementario de las infraestructuras del Parque Natural del Penyal d'Ifach, satisfaciendo las necesidades e inquietudes de un público sensible pero con escasas posibilidades de visita sobre espacios naturales que presentan problemas de accesibilidad (zona F, Mapa 6).

3.3. Programa de policía

3.3.1. Protección del sistema frente al entorno

El objetivo general de esta actuación es proteger la integridad y la funcionalidad de los ecosistemas incluidos en el área de estudio, así como la de disminuir el riesgo derivado de diversas conductas agresivas con los medios naturalizados. Es por ello que se propone la instalación de ciertos elementos disuasorios, lejos de las acostumbradas alambradas metálicas, fundamentalmente en las áreas norte, noreste y este, siempre respetando la propiedad privada en su límite con la de propiedad municipal. El resto de zonas de contorno, las del sector NW lindan con una urbanización de viviendas unifamiliares, están protegidas por las pantallas que se han propuesto en apartados anteriores.

3.3.2. Control de la calidad del agua

Se hace conveniente el control periódico de la calidad de las aguas que componen la masa de la laguna, sobre todo de aquellos espacios que puedan quedar al margen de la línea de corriente principal que la atravesará de NE a S. Los parámetros sujetos a control serán los de pH, cloruros, sulfatos, nitratos, nitritos, salinidad, conductividad y los análisis bacte-

riológicos adecuados a posibles elementos patógenos derivados de vertidos sin control y a la densidad de aves.

Los puntos de control serán los suficientes para asegurar la vigilancia por sectores y la toma de muestras coincidirá con los momentos de baja, media y alta actividad económica del municipio, es decir, invierno, verano y primavera.

3.3.3. Programa de seguimiento de vegetación y fauna

Por último, es pertinente un programa de seguimiento, tanto de las etapas que componen este plan, así como de los parámetros adecuados para estimar como indicadores el estado de los diferentes hábitats que componen el Parque de las salinas de Calpe.

En concreto sería oportuno el control de establecimiento de especies vegetales invasoras, el seguimiento minucioso de aquellas especies calificadas bajo alguna figura de protección, poblaciones de algunos vertebrados terrestres de interés, o calificadas de raras, y el seguimiento rutinario de la avifauna que visita o vive en este territorio. Para ello, pueden ser de gran interés los posibles programas de colaboración suscritos entre el Ayuntamiento y los centros de enseñanza en el ámbito municipal, ya que pueden destacar pequeños grupos que mediante protocolos simplificados, puedan dar

cumplida referencia a lo que más se acerca a los programas de vigilancia ambiental.

4. Conclusiones

Según lo expuesto a lo largo del presente estudio, hemos podido observar que la charca y el entorno de las Salinas de Calpe, tiene un excepcional interés ecológico, ya que unas mínimas medidas de gestión potenciarán su capacidad para generar un hábitat idóneo donde acoger distintas formas de vida, contribuyendo a incrementar la calidad ambiental de la zona y actuando como elemento complementario al espacio protegido del Penyal d'Ifach. Todo esto sin llegar a olvidar la fragilidad del entorno frente a los agentes externos, ya que el nivel de dependencia es bastante elevado, pudiendo darse procesos que pueden influir negativamente en el funcionamiento del sistema, como en el caso de la modificación del régimen hídrico, los procesos de erosión del suelo, que pueden contribuir en la colmatación del vaso de la laguna, la contaminación directa del agua o una inadecuada regulación de la misma.

El balance hídrico de la zona muestra una bondad climática interesante, con un período de déficit hídrico localizado en los meses estivales, aunque la tasa anual de precipitación permi-

te el uso de recursos hídricos que favorecen el sostenimiento de la configuración paisajística local. Térmicamente la masa de agua se comporta de una forma tremendamente inercial, al tratarse de aguas someras.

En cuanto a la flora y vegetación se citan más de cien especies, algunas de las cuales requieren un plan de eliminación por tratarse de elementos invasores que afectan la calidad de unas comunidades bien desarrolladas de maquia y matorral termomediterráneo.

Aunque el principal atractivo reside en la avifauna de palmípedas y en la misma tabla de agua, también se cuenta con efectivos de fauna típica mediterránea que aportan un cierto interés biótico a un entorno altamente antropizado por su especialización turística.

En ningún momento se debe olvidar la fragilidad del entorno frente a la acción directa o indirecta de agentes externos, ya que el nivel de dependencia es bastante elevado, pudiendo darse procesos que pueden influir negativamente en el funcionamiento del sistema, como en el caso de la modificación del régimen hídrico, los procesos de erosión del suelo, que pueden contribuir en la colmatación del vaso de la laguna, la contaminación directa del agua o una inadecuada regulación de la misma.

De este modo, la charca presenta un excepcional interés ecológico, ya que unas mínimas medidas de manejo y gestión potenciarán su capacidad para generar un espacio idóneo donde acoger distintas formas de vida, contribuyendo a incrementar la calidad ambiental de la zona y actuando como elemento complementario del espacio protegido del Penyal d'Ifach, ofreciendo, de este modo, un gran potencial para el desarrollo y realización de actividades de promoción y difusión ambiental.

5. Bibliografía

- ADAM, P. 1990. *Saltmarsh Ecology*. Cambridge University Press. Cambridge.
- ALLEN, J.R.L. & PYE, K. 1992. Coastal salt marshes: their nature and importance. In ALLEN J.R.L. & PYE, K. (eds), *Salt Marshes, Morphodynamics, Conservation and Engineering Significance*. Cambridge University Press, Cambridge: 1–18.
- BARBER, A.; GUARDIOLA, I.; ROSSELLÓ, A.; DRAPER, D. & GUTIÉRREZ, D. 1996. *Introducció a la botànica de la Marina Alta*. Associació Cultural Puig Llorença.
- BARBER, A. & MOITY, N. 2007. *Guía para conocer la flora del Parque Natural del Montgó*. Identia Institute. 75 pp.
- BOX AMORÓS, M. 1987. Humedales y áreas lacustres de la provincia de Alicante. Publicaciones de la Universidad de Alicante. 431 pp.

Plan de restauración y conservación del humedal urbano de Calpe, Alicante (SE España)

- CMA (CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE). 2000. Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. Memoria justificativa. <http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=922&idioma=C> [05/10/2012]
- EGUIBAR-GALÁN, M.A., SANCHIS-IBOR, C., MARCO-SEGURA, J.B. & MATEU-BELLÉS, J.B. 2007. El Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. Aspectos metodológicos. *Ingeniería del Agua*, 14(1): 23-35.
- FERNÁNDEZ, R., MARTÍN, A., ORTEGA, F. & ALES, E.E. 1992. Recent changes in landscape structure and function in a Mediterranean region of SW Spain (1950-1984). *Landscape Ecology*, 7(1): 3-18.
- FERNÁNDEZ-TORQUEMADA, Y., GONZÁLEZ-CORREA, J.M., MARTÍNEZ-PÉREZ, J.E. & SÁNCHEZ-LIZASO, J.L. 2005. Evaluation of the effects produced by the construction and expansion of marinas on *Posidonia oceanica* (L.) Delile meadows. *Journal of Coastal Research*, SI 49: 94–99.
- GÓMEZ, R., MORENO, J.L., MARTINEZ, B., VIDAL-ABARCA, M.R. & SUÁREZ, M.L. 1998. Valores naturales y potencialidades de uso de los humedales asociados a ramblas del sureste ibérico. I Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación de Aguas. Zaragoza. http://servbiob.inf.um.es/grupoeac/?page_id=432 [08/10/2012]
- GRISMER, M.E.; KOLLAR, J. & SYDER, J. 2004. *Assessment of hydraulic restoration of San Pablo marsh, California*. Environmental Monitoring and Assessment 98: 69-92.

- JESSEN, O. 1927. Die Spanische Ostküste von Cartagena bis Castellón. *Archäeol. Anzeiger.*, pag. 12.
- LLOPIS BERTOMEU, V. 1975. Calpe (3ª Edición). Excma. Diputación Provincial de Alicante. 261 pp.
- MARTÍNEZ-PÉREZ, J.E., MARTÍN, J. & SEVA, E. 2000. Paisajes amenazados de la Cuenca Mediterránea. Aplicación del SIG en el análisis de la dinámica de usos del territorio (1956-1998) en la Vall de Gallinera (Alicante-España). *Mediterranea*, 17: 5-44.
- PEÑA, J., BONET, A., BELLOT, J., SÁNCHEZ, J., EISENHUTH, D., HALLETT, S. & ALEDO, A. 2007. Driving forces of land-use change in a cultural landscape of Spain. In: KOOMEN, E., STILLWELL, J., BAKEMA, A. & SCHOLTEN, H.J. (eds) *Modelling land-use change. Progress and applications*. Springer, Dordrecht, pp 97–115.
- PÉREZ, M.R. 1997. *Flora vascular y vegetación de la comarca de la Marina Alta*. Ed. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial de Alicante. 566 pp.
- ZEDLER, J.B. y LEACH, M.K. 1998. Managing urban wetlands for multiple use: research, restoration, and recreation. *Urban Ecosystems*, 2: 189-204.

Notas

- 1.** Unidad de Cartografía de los Recursos Naturales
- 2.** Dept. de Ecología
- 3.** Dept. de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

Dirección: Unidad de Cartografía de los Recursos Naturales – Servicios Técnicos de Investigación, Ampliación Campus San Vicente. Ap. 99-E03080, Alicante, España.
e-mail: je.martinez@ua.es