MEDITERRANEA

SERIE DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS

2013 Época II N° 24

COMITÉ CIENTÍFICO:

G. U. CARAVELLO

S. G. CONARD

A. FARINA

A. FERCHICHI

A. A. RAMOS

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante
Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias

Revista electrónica anual

COMITÉ CIENTÍFICO:

S. G. CONARD. USDA Forest Service. Riverside. U.S.A.
A. FARINA. Lab. Ecología del Paisaje. Museo Historia Natural. Aulla. Italia.
A. FERCHICHI. I.R.A. Medenine. Túnez.
G. U. CARAVELLO. Istituto di Igiene. Università di Padova. Italia.
A. A. RAMOS. Dep. CC. Del Mar y Biología Aplicada. U.A. España.

COMITÉ EDITORIAL:

V. Peiró, A. Pastor-López, E. Seva. U.A.

DIRECCIÓN:

Eduardo Seva. Instituto Interdisciplinar para el Estudio del Medio «Ramón Margalef»
(IMEM). Universidad de Alicante.

SECRETARÍA:

Victoriano Peiró (V.peiro@ua.es). Gestor Jefe: Gema Iglesias (gema.iglesias@ua.es).
IMEM. Universidad de Alicante.

EDITA:

Servicio de Publicaciones. Universidad de Alicante.
<http://publicaciones.ua.es>

CORRESPONDENCIA:

Instituto Interdisciplinar para el Estudio del Medio «Ramón Margalef» (IMEM)
Ap. 99 - 03080 Alicante. España.
Teléfono de Secretaría: +34965903400, ext. 1184
Fax: Rev. Mediterránea. IMEM. +34965909873

I.S.S.N.: 0210-5004

Depósito Legal: A-1059-1984

Maquetación:

Marten Kwinkelenberg

Notas para los autores

Los trabajos versarán sobre aspectos de ecología, recursos naturales, paisaje, gestión ambiental, en los ecosistemas de la cuenca mediterránea.

Los manuscritos mecanografiados a doble espacio y por una sola cara se enviarán a la dirección del **Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio «Ramón Margalef» de la Universidad de Alicante (IMEM), Ap. 99 (03080 Alicante, España) —RevistaMediterranea—**. Los autores deberán enviar original y dos copias, así como en CD compatible en programas de tratamiento de texto WORD.

LENGUA: Redactados en español, inglés, francés o italiano.

NOMBRE DE AUTORES: Apellidos y nombres sin abreviaciones.

DIRECCIÓN: Dirección profesional (Organización, Centro de Investigación, Universidad,...) teléfono, telefax, dirección electrónica.

TÍTULO: conciso y completo, sin abreviaciones (max. 60 espacios).

RESÚMEN: Después del título, un resumen en inglés y otro en francés, de 1500 espacios como máximo, independientemente de la lengua utilizada en el texto del trabajo

PARÁGRAFOS: El manuscrito debe respetar el siguiente orden: (contenido) introducción sin título, párrafos con títulos cortos (max. 50 espacios), conclusiones, agradecimientos (si procede), referencias bibliográficas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Obligatorias para las publicaciones citadas en el texto, que irán en mayúscula. Las referencias de información no publicada (informes, comunicación personal...) se incluyen en el texto entre paréntesis. La bibliografía se presentará según los modelos siguientes:

GOSZ, J.R. and SHARPE, J.H. 1989. Broad-scale concepts for interactions of climate, topography, and biota and biome transitions. *Landscape Ecology* 3:229-243.

PIANKA, E. 1986. *Ecology and natural history of desert lizards*. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.

GOLDSMITH, V. 1979. Coastal dunes. In: R.A. Davis (ed.), *Coastal sedimentary environments*. New York:Springer-Verlag.

CORRECCIÓN DE PRUEBAS: Será realizada por la redacción de la revista, aunque los autores deben enviar un texto muy claro y definitivo. Si se hallan deficiencias notorias en el texto, el trabajo será remitido a los autores de inmediato.

TABLAS: Cada tabla en página por separado, numeradas siguiendo el orden de aparición en el texto y llevarán leyenda. El método de escritura admitido puede ser WORD o EXCEL.

GRÁFICAS y DIBUJOS: Presentados en papel blanco no reciclado, exclusivamente en blanco y negro. Las láminas en color deberán ser costeadas por los autores. Gráficas y dibujos deben ser presentados de forma que, modificando su dimensión, no se vea modificada su comprensión. Deberán acompañar las leyendas al gráfico, suficientemente grandes e incluidas en la caja del mismo. Es obligatorio acompañar archivo en el disco compatible y formato TIF o JPGE.

ILUSTRACIONES: Las fotografías, separadas del texto, con leyenda y número de orden, posición en el texto, etc.

NOTAS: Excepcionalmente se incluirán notas a pie, pero éstas deben ir en hojas separadas y debidamente numeradas.

EXTENSIÓN: El texto comprenderá una extensión de 5 (min.) a 25 (max.) páginas dactilomecanografiadas. El número de gráficos, dibujos y fotografías debe ser proporcional al tamaño del texto.

La dirección de la revista se reserva el derecho de revisar los trabajos presentados con el fin de adaptarlos a la publicación.

<http://publicaciones.ua.es>

Notes for the authors

SUBJECTS

Ecology

Natural Resources

Landscape

Environmental Management

Manuscripts typed on duplicate on one side of the sheet only, should be sent to the magazine direction: **Mediterranea. Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio «Ramón Margalef» (IMEM). Universidad de Alicante. Ap. 99 (03080 Alicante) Spain.** All authors are kindly requested to send their papers in writing, but namely on compatible CD, using WORD program. Every paper should conform to the following rules:

LANGUAGE: Spanish, English, French or Italian.

NAME OF THE AUTHORS: Preceded by the full first name without abbreviations.

ADDRESS: Institutional address of author(s) (Institutions, Research Centre, University), telephone, fax, electronic adress..

TITLE: Concise but detailed enough, without abbreviations (max. 60 strokes).

ABSTRACTS: In English and French, whatever it might be the language of the paper. The lenght should not exceed 1500 strokes.

PARAGRAPHS: Should be arranged as follows: (contents) introduction without title, paragraphs with short titles (max. 50 strokes), conclusions, acknowledgments (if required), references.

REFERENCES: Should include only publications mentioned in the text. References to unpublished informations (reports, personal communications, etc.) should be included between parentheses in the text. The bibliography should be presented in conformity with the following patterns:

GOSZ, J.R. and SHARPE, J.H. 1989. Broad-scale concepts for interactions of climate, topography, and biota and biome transitions. *Landscape Ecology* 3:229-243.

PIANKA, E. 1986. *Ecology and natural history of desert lizards*. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.

GOLDSMITH, V. 1979. Coastal dunes. In: R.A. Davis (ed.), *Coastal sedimentary environments*. New York:Springer-Verlag.

CORRECTIONS TO THE PROOF: Will be done by the editorial staff. Authors are kindly requested to submit a clear and final paper.

TABLES: Each table should be on a separate sheet, numbered consecutively, with a legend. The writing method admitted is WORD, EXCEL..

GRAPHICS AND DRAWINGS: Separated from the text, should be lettered on white or glossy paper, in black and white in compatible disks TIF or JPGE format. They should be clearly "constructed", with sufficiently big letters within the block of the graph.

ILLUSTRATIONS: Photographs should be numbered and lettered.

NOTES: They should be numbered and referred to in the text. They should be compiled on separate sheets.

LENGHT: Preferably between 5 (min.) and 25 (max.) typed pages. The number of illustrations, tables and graphs should be proportional to the lenght of the text.

The articles are reviewed by the editorial staff to be conformed for their publication.

<http://publicaciones.ua.es>

La ecología del paisaje es una rama reciente de la ecología que ofrece teoría y métodos para explicar las dinámicas ecológicas de grandes áreas y abre nuevas perspectivas sobre los problemas relacionados con la gestión de los ecosistemas y la planificación del uso del territorio. La atención de la ecología del paisaje se centra en la identificación de las causas y las consecuencias de la heterogeneidad espacial, que es fruto de complejas interacciones entre la biota y el ambiente, además de en la actividad humana que ha contribuido desde tiempos prehistóricos a los cambios del paisaje y es responsable actualmente de profundas y repentinas alteraciones. El punto de vista de la ecología del paisaje integra el contexto natural con el contexto humano y centra su atención en lo que Almo Farina denomina “el

mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos antrópicos. Los ambientes influidos por el hombre han sido durante largo tiempo cosecha ignorada por los ecólogos porque resultaban poco atractivos desde el punto de vista naturalista; sin embargo son precisamente los “paisajes culturales” (es decir, áreas moderadamente modificadas por el hombre que comprenden elementos naturales) los que proporcionan la clave para la comprensión de los procesos que llevan a la integración entre las realidades naturales y la realidad humana.

Almo Farina está profundamente convencido de que el conocimiento de los procesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los ambientes modificados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emergen de los sistemas naturales.

La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de integración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confiere al autor de este texto una carga de entusiasmo que se traduce en una presentación apasionante de la disciplina. Al interés intrínseco de los argumentos cabe añadir: a) la simplicidad del lenguaje específico que facilita la comprensión; b) una serie de ejemplos de muchas de ellas referidas a los ambientes montañosos de los Apeninos donde el autor ha realizado gran parte de sus investigaciones) que esclarecen el corpus doctrinal presentado pero que, en definitiva, son puramente mediterráneos; c) la continua referencia a los argumentos relacionados y a sus aplicaciones.

Una excelente publicación de ecología espacial de la Universidad de Alicante

HASNAOUI, Okkacha et BOUAZZA, Mohamed

**Contribution à l'étude diachronique des
écosystèmes de la partie Nord ouest
Algérienne : cas du groupement de
Tlemcen**

Índice

Portada

Créditos

Résumé	198
Abstract	200
Introduction	201
Materiel et methode.....	204
3. Resultats et discussion	207
Conclusion	216
Références bibliographiques.....	217
Notas	220

Contribution à l'étude diachronique des écosystèmes de la partie Nord ouest Algérienne : cas du groupement de Tlemcen

HASNAOUI, Okkacha (1), (2) et BOUAZZA, Mohamed (2)

Résumé

L'étalement urbain, appelé communément «ville diffuse», est très consommateur d'espace. Il maximise la compétition foncière avec les activités déjà présentes et notamment avec l'agriculture. Dans ce contexte nous avons effectué une étude diachronique afin de cerner la dynamique des écosystèmes et des agro-systèmes localisés dans le groupement de Tlemcen (Nord Ouest Algérie).

L'analyse diachronique des structures paysagères de ce groupement à partir des cartes établies en 1959 et des photos satellitaires prises en 2012 met en évidence la dynamique régressive des écosystèmes de proximité et la fragmentation

Contribution à l'étude diachronique des écosystèmes de la partie Nord ouest Algérienne : cas du groupement de Tlemcen

des réseaux de formations naturelles. Cette évolution des structures végétales dans le temps est liée à la très forte augmentation des surfaces bâties entraînant la dégradation des peuplements végétaux et animaux de la région d'étude.

Avec l'expansion démographique que connaît actuellement l'Algérie en général et la wilaya de Tlemcen en particulier la protection de la nature dans les zones de proximité trouve du mal à être appliqué. Ce sont généralement les milieux ouverts limitrophes des agglomérations qui sont les plus touchés par cet impact. Dans le groupement de Tlemcen l'urbanisation à outrance entraîne une érosion du patrimoine faunistique, floristique et édaphique. Ainsi de nombreuses espèces végétales ont disparu de la zone d'étude telle que : *Ammoides verticillata*, *Thymus ciliatus*, *Nepeta multibracteata*; d'autres vont disparaître dans un proche avenir c'est le cas de : *Chamaerops humilis*, *Calycotome spinosa*, *Asparagus stipularis*. Nous avons noté aussi l'expansion des espèces anthropiques telles que : *Asphodelus microcarpus*, *Urginea maritima*, *Paronychia argentea*.

Les agro-systèmes de la zone d'étude ont subi des modifications et les grandes superficies à vigne ont pratiquement disparu et sont remplacées par d'autres spéculations à base principalement d'arbres fruitiers (Olivier, prunier, abricotier,

oranger, pommier), réaffectées à la céréaliculture ou laissées en jachère.

Mots clés : Ecosystème ; Tlemcen; Dynamique végétale; Analyse diachronique; Urbanisation.

Abstract

Urban sprawl, commonly called «diffuse city» is very consumer of space. It maximizes the land competition with the activities already present and in particular agriculture. In this context we conducted a study to identify the dynamics of ecosystems and agro-systems located in the group of Tlemcen (North West Algeria).

The diachronic analysis of landscape structures of this group established from maps in 1959 and satellite photos taken in 2012 highlights the regressive dynamic of ecosystems and fragmentation of natural formations networks. The evolution of plant structures over time is related to the sharp increase in built leading to the degradation of plant and animal populations in the study area.

With population growth in Algeria general and Tlemcen in particular the protection of nature in the nearby of the agglomerations is difficult to be applied. Globally the ecosystems located nearby of the towns are usually most affected by the impact.

Contribution à l'étude diachronique des écosystèmes de la partie Nord ouest Algérienne : cas du groupement de Tlemcen

In the group of Tlemcen the urbanization leads to excessive erosion of fauna, flora and soil.

So many plant species have disappeared from the study area such as: *Ammoides verticillata*, *Thymus ciliatus*, *Nepeta multibracteata*, others will disappear in the near future this is the case: *Chamaerops humilis* *Calycotome spinosa*, *Asparagus stipularis*. We noted also expanding human species such as *Asphodelus microcarpus*, *Urginea maritima*, *Paronychia argentea*.

The agro-systems in the study area have undergone changes and the large areas in vine have virtually disappeared and are replaced by other crops based mainly on fruit trees (Olive, apricot, orange, and apple) or reallocated to cereal or let fallow.

Keywords: Ecosystem; Tlemcen, vegetation dynamics, Analysis diachronic, Urbanisation.

Introduction

Les écosystèmes actuels résultent des activités humaines souvent intenses. BUREL et BAUDRY (1999) considèrent que l'environnement est la résultante de l'intervention de l'homme à travers son histoire naturelle et culturelle. Actuellement et devant l'explosion démographique

que connaît l'humanité les écosystèmes subissent des modifications importantes se traduisant dans de nombreux cas par une perturbation irréversible des structures végétales en place. La consommation de l'espace environnemental par l'urbanisation n'est pas un phénomène actuel mais il s'est amplifié ces dernières décades. Cette artificialisation des milieux naturels appauvrit les ressources naturelles et entraîne une fragmentation des biotopes et une réduction des aires de répartition des espèces végétales et animales. La diversité sous ces différentes formes (génétique, spécifique et écosystémique) (LEVEQUE et MOUNOLOU , 2001) est perturbée par actions anthropiques.

Une prise de conscience mondiale sur la question de l'environnement est apparue ces dernières années ayant pour but la conservation du patrimoine phyto génétique et zoo génétique. Les états sont devenus aujourd'hui sensibles sur les questions de l'environnement. Cette sensibilité s'est traduite par des pressions qui s'exercent sur les sociétés et les entreprises qui entravent le bon fonctionnement des écosystèmes.

La conservation et la gestion de ces derniers visent à préserver les processus écologiques afin de mettre à l'abri le fonctionnement naturel et les mécanismes évolutif propre à eux (LONG ; 1972 ; DYNESIUS et NILSON, 1994; TARDIF

Contribution à l'étude diachronique des écosystèmes de la partie Nord ouest Algérienne : cas du groupement de Tlemcen

et al., 2005 ; PRIMACK, 2006). Dans la région de Tlemcen (Nord-Ouest Algérie), la modification de la physionomie des écosystèmes et des paysages campagnards menacent l'agriculture péri-urbaine d'une part et la richesse du patrimoine naturel d'autre part. Ces modifications mettent en danger les ressources végétales, animales et édaphiques.

Avec l'expansion démographique que connaît actuellement l'Algérie en générale et la wilaya de Tlemcen en particulier la protection de l'environnement dans les zones de proximité trouve du mal à être appliquée. Ce sont généralement les écosystèmes de proximité qui sont les plus touchés par cet impact (HASNAOUI, 2008).

D'après le schéma directeur de l'aménagement du territoire (P.D.A.U) de 2005, la wilaya regroupe quatre grandes communes pour constituer le groupement du grand Tlemcen. Celui-ci englobe les communes de : Tlemcen ; Chétouane ; Mansourah et Béni Mester. L'étalement urbain de cet ensemble s'effectue sur les terres agricoles et sur les écosystèmes de proximité entraînant des modifications physionomiques et paysagères avec une érosion des ressources naturelles (floristique, faunistique et édaphique). Sur le plan floristique de nombreux travaux ont été réalisés dans la région et les résultats mettent en relief le danger d'une régression du patri-

moine phytogénétique (HASNAOUI, 2008– 2009 ; ASPEWIT, 2008 ; HACHEMI, 2011; HACHEMI et *al.*, 2012).

Le présent travail porte sur une étude diachronique (1959 et 2012) des écosystèmes et des agro-systèmes des principales communes du groupement de Tlemcen à savoir : Tlemcen, Chétouane et Mansourah. Dans cette approche nous avons pris les travaux réalisés en 1959 par l'institut national géographique et ceux que nous avons effectués en 2012 à partir des photos satellites et actualisé sur le terrain. L'analyse comparative permet de dégager les modifications survenues sur les écosystèmes suite à l'action de l'homme sur son milieu environnant durant cette période de plus de 50 ans.

La démarche utilisée ; jamais réalisée jusqu'à ce jour ; permet de poser un regard critique sur l'écart problématique entre la connaissance scientifique que l'on a sur les milieux naturels de la wilaya et la difficulté de transférer cette compréhension aux autorités compétentes en vue d'une protection de la biodiversité.

Materiel et methode

2.1. Cadre physique

La zone d'étude se situe au nord de l'Algérie occidentale. Géographiquement elle a pour coordonnées géographiques

Contribution à l'étude diachronique des écosystèmes de la partie Nord ouest Algérienne : cas du groupement de Tlemcen

moyennes: 1° 38 W de longitude et 34° 55 de latitude N. Elle englobe les communes suivantes: Tlemcen; Chétouane, Mansourah et Béni Mester. La superficie globale est évaluée à 25740 ha. Cet ensemble se situe sur des terres agricoles de bonne valeur agronomique et sur des écosystèmes ouverts constitués principalement des espèces végétales suivantes : *Olea europea* ; *Chamaerops humilis*, *Calycotome intermedia*, *Asparagus stipularis*, *Asparagus acutifolius* ; *Quercus ilex*, *Phyllirea angustifolia*. Les différentes agglomérations sont reliées entre elles par un réseau routier dense constitué par la Route Nationale (R.N) N° 07 qui relie l'Est (Commune de Ouled El Mimoun) à l'Ouest (Commune de Sabra) et la R.N 22 qui relie le Nord (Commune d'Hennaya) au Sud (Commune de Sebdou) (figure 1).

2.2. Analyse de la végétation

Afin de connaître la composition systématique des structures végétales en place nous avons procédé à un échantillonnage aléatoire. Le choix des stations retenues dans ce genre d'étude nous a été imposé par les reliques végétales observables encore dans la zone d'étude d'une part et par la dynamique urbanistique du terrain d'autre part. 5 stations ont été retenues il s'agit de : Station de Bouhanak, Ouzidan, Mansourah, Ain-El-Houtz et Oudjelida. Quant à la technique

Contribution à l'étude diachronique des écosystèmes de la partie Nord ouest Algérienne : cas du groupement de Tlemcen

- a. Carte topographique établie par l'Institut National Géographique de la région de Tlemcen (Carte de Base datant de 1959) ;
- b. Photos satellites de la région de Tlemcen établies en 2012 ;
- c. Logiciel de traitement des données Map-info 7.5 ;
- d. Missions de terrains pour actualiser les données.

Durant notre investigation seule les grands pôles urbanistiques ont été étudiés à savoir : Tlemcen, Chétoune et Mansourah.

3. Resultats et discussion

Le développement démographique est une cause historique et influençable de l'étalement urbain. Par l'accroissement de la population, l'espace devient de plus en plus rare dans la cité, ce qui la pousse à grandir en hauteur ou en largeur (DA CUNHA et VON UNGERN STENBERG, 2003). L'évolution démographique que connaît actuellement la région de Tlemcen nécessite des infrastructures importantes tant sur le plan d'immobilier, routier, parc d'attraction, aire de jeux etc.

3.1. Dynamique urbanistique

La comparaison entre les superficies des bâties entre 1959 et 2012 montrent une évolution très importante. La figure 2

Figure 2 : Situation du bâti en 1956
Construction situation in 1956

montre l'étalement des structures bâties et les espaces naturels et agricoles qui existaient en 1959. Le calcul des superficies urbanisées en cette période donne un total moyen de 1010 ha en construction agglomérée auquel s'ajoute les constructions éparses de Ouzidan, Ain-El-Houtz et Koudia.

Nous remarquons l'existence d'une grande superficie de vigne, d'olivier (cultivé et sauvage), de vergers et cultures an-

Contribution à l'étude diachronique des écosystèmes de la partie Nord ouest Algérienne : cas du groupement de Tlemcen

nuelles qui entouraient les habitations. A titre d'exemple plus de 2200 ha de vigne étaient planté dans les communes étudiées. Aussi les milieux ouverts appelé encore matorrals en sens écologique étaient très présents. Ces formations étaient à base de *Calycotome*, *Chamaerops*, *Withania*, *Asparagus* pour ne citer que ces espèces. Quant aux formations forestières elles se cantonnaient principalement sur le Plateau de Lalla Setti et Djebel El Hadid.

L'étalement urbain a commencé à s'amplifier vers les années 1970 avec l'encouragement et l'aide étatique accordé aux citoyens de la région. Depuis, les terres de toutes natures (agronomiques ou autres) quelle soit domaniale ou privé ont été convoitée par le béton. Les superficies artificialisées se sont amplifiées et les zones résidentielles sont de plus en plus nombreuses.

Les terres agricoles qui constituaient le croissant fertile de Tlemcen ont été exposées à une forte artificialisation. Les terres qui avaient la meilleure capacité agronomique sont englouties par le béton. Historiquement les villes se sont installées dans les régions les plus fertiles, les mieux irriguées et les plus facilement exploitables. Actuellement de cette richesse en terre agricole de meilleure capacité agronomique ne persiste que quelques espaces voués à une disparition

très prochaine. SAINTENY (2008) constate que l'une des causes qui entraîne un étalement urbain est le prix plus bas du foncier. Dans notre cas et d'après notre enquête le prix du terrain est l'un des facteurs de l'étalement urbain conjugué aux modifications climatiques et aux aspirations sociales pressantes de la population en matière de construction. Ce sont les terres domaniales qui ont été les premières urbanisées puis les terres privées en second lieu.

Après la prise de conscience des hauts responsables de la gravité de la disparition des terres agricoles et devant les demandes grandissantes de demandeurs de logements l'artificialisation des ressources naturelles s'est orientée vers les écosystèmes naturels de proximité. De nombreux milieux ouverts se sont transformés en béton. Les matorrals de Oudjelida, Boudjelida ; Djebel Sidi Yahia ; Bouhanak ; Djebel El Horra, Plateau de Lalla Setti qui abritaient des espèces protégées par la loi ont été artificialisés (figure 3).

Numériquement une superficie de plus de 6000 ha de végétation naturelle a fait l'objet d'une artificialisation laquelle a entraîné une régression des aires de répartition des espèces végétales et/ou leur disparition.

Contribution à l'étude diachronique des écosystèmes de la partie Nord ouest Algérienne : cas du groupement de Tlemcen

Figure 3 : Dynamique des constructions des communes étudiée
Dynamic of the constructions in the municipalities studied

3.2. Sens de l'artificialisation

Les communes qui constituent le grand Tlemcen sont implantées sur des terrains géo morphologiquement différents. La diffusion du béton s'est opérée dans le sens Nord-Est ; Nord-Nord et Nord-Ouest. Cette orientation a été faite selon la nature des terrains (facilement urbanisable ou non).

Du côté nord de la ville de Tlemcen les meilleurs vergers ont disparus. En 1960 les agro-systèmes étaient à base d'arbres fruitiers suivants : vigne, pêcher, abricotier, prunier, amandier, olivier auxquelles s'ajoutaient de grandes superficies céréalières ou maraîchères. Une fois les terres agricoles étatiques consommées complètement se sont les milieux ouverts qui ont été convoités. Ces derniers étaient riches en espèces aromatiques et médicinales et aussi en espèces palatables.

Les matorrals sont consommés à plus de 50% et ne persiste que quelques formations basses soumises aux multiples agressions anthropiques (coupes, incendies, surpâturage, défrichement, pistes, travaux d'aménagements).

3.3. Dynamique de la végétation

Deux volets ont été abordés dans cette partie :

- i. Végétation spontanée,
- ii. Végétation cultivée.

i. Végétation spontanée

Afin de cerner l'évolution spatio-temporelle de la végétation nous avons effectués des prélèvements floristiques sur des stations reliques dans lesquelles une richesse floristique demeure encore. De l'analyse comparative des différents rele-

Contribution à l'étude diachronique des écosystèmes de la partie Nord ouest Algérienne : cas du groupement de Tlemcen

vés conjuguée à une enquête réalisé auprès des agriculteurs, des connaisseurs et des habitants âgés de la région d'étude on a déduit la dynamique des espèces du groupement de Tlemcen (Tab. 1).

Espèces disparues	Espèces en danger	Espèces en extension
<i>Ammoides verticillata</i>	<i>Calycotome intermedia</i>	<i>Bromus rubens</i>
<i>Sideritis montana</i>	<i>Marrubium vulgare</i>	<i>Urginea maritima</i>
<i>Arisarum vulgare</i>	<i>Chamaerops humilis</i>	<i>Asphodelus microcarpus</i>
<i>Thymus ciliatus</i>	<i>Olea europea</i> var. <i>sylvestris</i>	<i>Aegilops triuncialis</i>
<i>Withania frutescens</i>	<i>Avena sterilis</i>	<i>Echinops spinosus</i>
<i>Rubia peregrina</i>	<i>Allium nigrum</i>	<i>Silybium Marianum</i>
<i>Salvia verbenaca</i>	<i>Daphne gnidium</i>	<i>Urtica dioica</i>
<i>Asparagus stipularis</i>	<i>Convolvulus althaeoides</i>	<i>Urtica urens</i>
<i>Asparagus acutifolius</i>	<i>Inula viscosa</i>	<i>Borrago officinalis</i>
<i>Serapias lingua</i>	<i>Pistacia lentiscus</i>	<i>Paronychia argentea.</i>
<i>Serapias longipetala</i>	<i>Linum strictum</i>	
<i>Aristolochia longa</i>	<i>Dipcadi seratinum</i>	
<i>Ajuga iva</i>	<i>Fagonia cretica</i>	
<i>Nepeta multibracteata</i>	<i>Calendula arvensis</i>	
<i>Smilax aspera</i>	<i>Teucrium fruticans</i>	
<i>Ruta chalepensis</i>	<i>Dactylis glomerata</i>	
<i>Mentha pulegium</i>	<i>Orchis italica</i>	
	<i>Prasium majus</i>	
	<i>Lobularia maritima</i>	
	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	

Tableau 1 : Dynamique des principales espèces de la zone d'étude

On distingue trois catégories de plantes :

- a. Les principales espèces ayant disparues de la région sont les espèces qui ont une utilité médicinale et/ou sont aromatique et qui sont très convoitées par la population locale d'une part ou bien elles se trouvent dans les assiettes urbanisables d'autre part.
- b. Les espèces vulnérables et qui vont disparaître dans un proche avenir sont celles qui sont limitrophes aux agglomérations (zones urbanisables) et/ou appartiennent à des écosystèmes ouverts exposés aux surpâturages, aux incendies à répétition, aux défrichements et aux coupes.
- c. c– Le groupe 3 est représenté par les espèces en extension et cela suite aux différentes activités humaines. Ce sont surtout les espèces rudérales, toxiques et /ou épineuses qui constituent ce groupe.

Sur le plan biologique sensu RAUNKIAER on constate une augmentation des espèces chamaephytique et thérophytique. Le fort pourcentage des thérophytes et des Chamaephytes (plus de 70%) est l'une des conséquences de l'impact humain sur les écosystèmes de la zone d'étude (HASNAOUI et ZEBENTOUT, 2012).

Contribution à l'étude diachronique des écosystèmes de la partie Nord ouest Algérienne : cas du groupement de Tlemcen

Globalement nos résultats corroborent avec ceux de SAINTENY (2008). La réduction des aires naturelles, l'appauvrissement de la biodiversité, la fragmentation des biotopes, les risques grandissants des inondations dus à l'imperméabilisation des sols et les érosions des sols de bonne qualité agromonomique sont les principales conséquences observées dans la zone d'étude.

ii. Végétation cultivée

L'analyse comparative des cartes N° 2 et 3 montre une régression des superficies cultivées. De nombreuses terres de bonne valeur agricole ont été cédées à l'urbanisation. Entre 1970 et 2012 la ville de Tlemcen a cédé à elle seule 1016 ha à la construction et 163 ha sont en cours de réalisation ; l'agglomération de « Abou Techfine » (Nord de Tlemcen) a vu sa superficie bâtie augmentée de plus de 100 ha en passant de 30 ha en 1959 à 133 ha actuellement. L'agglomération de Chétouane, a vu sa superficie construite augmentée de plus de la moitié en passant de 21,5 ha à 52,5 ha. Nous constatons de nos jours l'implantation de nouvelles villes telle que : Oudjelida, Boudjelida, Koudia et Bouhanak. Ces dernières sont implantées sur des écosystèmes naturels et/ou des agro-systèmes entraînant une régression importante des aires de répartition de nombreux taxons.

Conclusion

L'étalement urbain que connaissent actuellement les trois grandes communes étudiées perturbe les écosystèmes naturels et les agro-systèmes. La forte urbanisation a dérégulé l'accès au foncier agricole et a causé un appauvrissement des ressources phytogénétiques. De nombreux propriétaires nourrissent l'espoir de réaliser une plus-value en vendant leur terrain agricole en terrain constructible. Cette façon de faire a réduit considérablement les espaces agricoles et les terres de bonne valeur agronomique sont englouties par le béton. Les terrains domaniaux constitués essentiellement de parcours et de milieux ouverts riches en espèce spontanées n'ont pas échappé à ce phénomène. De nombreuses espèces floristiques ont disparues de la région principalement celles qui sont utilisées en médecine traditionnelle (*Ammoides verticillata*, *Thymus ciliatus*, *Nepeta multibracteata*, *Mentha pulegium*, *Thymus ciliatus*). Le décret ministériel 12-03 du 04-01-2012 stipulant la protection des espèces végétales trouve du mal à être appliqué.

Du côté des agro-systèmes les superficies à vigne ont disparues presque dans leur totalité et les terres sont en majorité réaffectées ou laissées en jachère.

Contribution à l'étude diachronique des écosystèmes de la partie Nord ouest Algérienne : cas du groupement de Tlemcen

L'érosion des ressources naturelles suite aux fortes activités humaines est un problème récurrent dans le groupement de Tlemcen. Il est urgent de prévoir les risques auxquelles sont exposées les formations végétales.

Le classement des écosystèmes selon le degré d'anthropisation est une nécessité afin de conserver ce qui reste des ressources phytogénétiques.

Les stratégies de conservation doivent être renforcées par :

- L'application rigoureuse des décrets ministériels,
- Protection des espèces les plus fragiles,
- Sauvegarder les écosystèmes agressés,
- Prévenir et éduquer le public.

Références bibliographiques

- ASPEWIT, (2008). Atlas de l'environnement de la wilaya de Tlemcen, 240 p.
- BUREL, F. et BAUDRY, J. (1999). Ecologie du paysage : concept, méthode et applications (Paris : Tec et Doc.).
- BRAUN BLANQUET (1952). Phytosociologie appliquée. Comm. Sigma, N° 116.
- DA CUNHA et VON UNGEN-STERMBERG, (2003). Impacts de l'étalement urbain ; Forum environnement: développement urbain durable; 34 p.

- DYNESIUS, M. et NILSON, C. (1994). Fragmentation and flow regulation of river systems in the northern third of the world. *Science, New Série* 266, 753-762.
- HACHEMI, N. (2011). Contribution à une étude du cortège herbacée des matorrals du versant sud de la région de Tlemcen ; Thèse de Magister. Fac. Sci. Univ. Tlemcen, 180 p.
- HACHEMI, N., HASNAOUI, O., BENMEHDI, I., MEJATI, N. et BOUAZZA, M. (2012). Contribution à l'étude de la thérophytisation des matorrals des versants sud des monts de Tlemcen (Algérie occidentale)– *Mediterranea* ; *Serie de Estudios Biologicos– Epoca II* N° 23 ; 158-180 p.
- HASNAOUI, O. (2008). Contribution à l'étude de la Chamaeropaie de la région de Tlemcen : Aspects écologiques et cartographie. Thèse Doct. Univ. Abou Bakr Belkaid Tlemcen – Algérie, 204 p. + annexes.
- HASNAOUI, O. et ZEBENTOUT, H. (2012). Dynamique des écosystèmes naturels du groupement de Tlemcen (Algérie occidentale) ; *PhytoChem et BioSub Journal* ; Vol. 5 N° 1 ; 38-45.
- INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (1959). Carte de la région de Tlemcen (Algérie)– Feuille N° 270.
- LEVEQUE, CH et MOUNOLOU, J-C, (2001). Biodiversité, dynamique biologique et conservation, Ed. Dunod, 248p.
- 12-LONG, G., (1972). A propos du diagnostic écologique appliqué au milieu de vie de l'homme. *CIHEAM– Options Méditerranéennes*, 46-51.

Contribution à l'étude diachronique des écosystèmes de la partie Nord ouest Algérienne : cas du groupement de Tlemcen

- P.D.A.U, (2005). Plan de développement et d'aménagement de la wilaya de Tlemcen.
- PRIMACK, R.B (2006). Essentials of conservation biology. Fourth edition (Sunderland, MA, EU: Sinauer Associates, Inc.)
- SAINTENY, G. (2008). L'étalement urbain ; Responsabilité et environnement N° 49 ; 7-16 p.
- TARDIF, B., LAVOIE, G. et LACHANCE, Y. (2005). Atlas de la biodiversité du Québec. Les espèces menacées ou vulnérables. Gouvernement du Québec, Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs. Direction du développement durable du patrimoine écologique et des parcs, Québec.

Notas

1. Université Dr Tahar Moulay– Faculté des Sciences et Technologie
– Saida Algérie–
E-mail :okhasnaoui2001@yahoo.fr
2. Laboratoire d'écologie et gestion des écosystèmes naturels ; Uni-
versité Abou Bakr Belkaid– Tlemcen – Algérie –
E-mail : lecgen_tlm@yahoo.fr