MEDITERRANEA

SERIE DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS

2013 Época II N° 24

COMITÉ CIENTÍFICO:

G. U. CARAVELLO

S. G. CONARD

A. FARINA

A. FERCHICHI

A. A. RAMOS

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante
Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias

Revista electrónica anual

COMITÉ CIENTÍFICO:

S. G. CONARD. USDA Forest Service. Riverside. U.S.A.
A. FARINA. Lab. Ecología del Paisaje. Museo Historia Natural. Aulla. Italia.
A. FERCHICHI. I.R.A. Medenine. Túnez.
G. U. CARAVELLO. Istituto di Igiene. Università di Padova. Italia.
A. A. RAMOS. Dep. CC. Del Mar y Biología Aplicada. U.A. España.

COMITÉ EDITORIAL:

V. Peiró, A. Pastor-López, E. Seva. U.A.

DIRECCIÓN:

Eduardo Seva. Instituto Interdisciplinar para el Estudio del Medio «Ramón Margalef»
(IMEM). Universidad de Alicante.

SECRETARÍA:

Victoriano Peiró (V.peiro@ua.es). Gestor Jefe: Gema Iglesias (gema.iglesias@ua.es).
IMEM. Universidad de Alicante.

EDITA:

Servicio de Publicaciones. Universidad de Alicante.
<http://publicaciones.ua.es>

CORRESPONDENCIA:

Instituto Interdisciplinar para el Estudio del Medio «Ramón Margalef» (IMEM)
Ap. 99 - 03080 Alicante. España.
Teléfono de Secretaría: +34965903400, ext. 1184
Fax: Rev. Mediterránea. IMEM. +34965909873

I.S.S.N.: 0210-5004

Depósito Legal: A-1059-1984

Maquetación:

Marten Kwinkelenberg

Notas para los autores

Los trabajos versarán sobre aspectos de ecología, recursos naturales, paisaje, gestión ambiental, en los ecosistemas de la cuenca mediterránea.

Los manuscritos mecanografiados a doble espacio y por una sola cara se enviarán a la dirección del **Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio «Ramón Margalef» de la Universidad de Alicante (IMEM), Ap. 99 (03080 Alicante, España) —RevistaMediterranea—**. Los autores deberán enviar original y dos copias, así como en CD compatible en programas de tratamiento de texto WORD.

LENGUA: Redactados en español, inglés, francés o italiano.

NOMBRE DE AUTORES: Apellidos y nombres sin abreviaciones.

DIRECCIÓN: Dirección profesional (Organización, Centro de Investigación, Universidad,...) teléfono, telefax, dirección electrónica.

TÍTULO: conciso y completo, sin abreviaciones (max. 60 espacios).

RESÚMEN: Después del título, un resumen en inglés y otro en francés, de 1500 espacios como máximo, independientemente de la lengua utilizada en el texto del trabajo

PARÁGRAFOS: El manuscrito debe respetar el siguiente orden: (contenido) introducción sin título, párrafos con títulos cortos (max. 50 espacios), conclusiones, agradecimientos (si procede), referencias bibliográficas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Obligatorias para las publicaciones citadas en el texto, que irán en mayúscula. Las referencias de información no publicada (informes, comunicación personal...) se incluyen en el texto entre paréntesis. La bibliografía se presentará según los modelos siguientes:

GOSZ, J.R. and SHARPE, J.H. 1989. Broad-scale concepts for interactions of climate, topography, and biota and biome transitions. *Landscape Ecology* 3:229-243.

PIANKA, E. 1986. *Ecology and natural history of desert lizards*. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.

GOLDSMITH, V. 1979. Coastal dunes. In: R.A. Davis (ed.), *Coastal sedimentary environments*. New York:Springer-Verlag.

CORRECCIÓN DE PRUEBAS: Será realizada por la redacción de la revista, aunque los autores deben enviar un texto muy claro y definitivo. Si se hallan deficiencias notorias en el texto, el trabajo será remitido a los autores de inmediato.

TABLAS: Cada tabla en página por separado, numeradas siguiendo el orden de aparición en el texto y llevarán leyenda. El método de escritura admitido puede ser WORD o EXCEL.

GRÁFICAS y DIBUJOS: Presentados en papel blanco no reciclado, exclusivamente en blanco y negro. Las láminas en color deberán ser costeadas por los autores. Gráficas y dibujos deben ser presentados de forma que, modificando su dimensión, no se vea modificada su comprensión. Deberán acompañar las leyendas al gráfico, suficientemente grandes e incluidas en la caja del mismo. Es obligatorio acompañar archivo en el disco compatible y formato TIF o JPGE.

ILUSTRACIONES: Las fotografías, separadas del texto, con leyenda y número de orden, posición en el texto, etc.

NOTAS: Excepcionalmente se incluirán notas a pie, pero éstas deben ir en hojas separadas y debidamente numeradas.

EXTENSIÓN: El texto comprenderá una extensión de 5 (min.) a 25 (max.) páginas dactilomecanografiadas. El número de gráficos, dibujos y fotografías debe ser proporcional al tamaño del texto.

La dirección de la revista se reserva el derecho de revisar los trabajos presentados con el fin de adaptarlos a la publicación.

<http://publicaciones.ua.es>

Notes for the authors

SUBJECTS

Ecology

Natural Resources

Landscape

Environmental Management

Manuscripts typed on duplicate on one side of the sheet only, should be sent to the magazine direction: **Mediterranea. Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio «Ramón Margalef» (IMEM). Universidad de Alicante. Ap. 99 (03080 Alicante) Spain.** All authors are kindly requested to send their papers in writing, but namely on compatible CD, using WORD program. Every paper should conform to the following rules:

LANGUAGE: Spanish, English, French or Italian.

NAME OF THE AUTHORS: Preceded by the full first name without abbreviations.

ADDRESS: Institutional address of author(s) (Institutions, Research Centre, University), telephone, fax, electronic adress..

TITLE: Concise but detailed enough, without abbreviations (max. 60 strokes).

ABSTRACTS: In English and French, whatever it might be the language of the paper. The lenght should not exceed 1500 strokes.

PARAGRAPHS: Should be arranged as follows: (contents) introduction without title, paragraphs with short titles (max. 50 strokes), conclusions, acknowledgments (if required), references.

REFERENCES: Should include only publications mentioned in the text. References to unpublished informations (reports, personal communications, etc.) should be included between parentheses in the text. The bibliography should be presented in conformity with the following patterns:

GOSZ, J.R. and SHARPE, J.H. 1989. Broad-scale concepts for interactions of climate, topography, and biota and biome transitions. *Landscape Ecology* 3:229-243.

PIANKA, E. 1986. *Ecology and natural history of desert lizards*. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.

GOLDSMITH, V. 1979. Coastal dunes. In: R.A. Davis (ed.), *Coastal sedimentary environments*. New York:Springer-Verlag.

CORRECTIONS TO THE PROOF: Will be done by the editorial staff. Authors are kindly requested to submit a clear and final paper.

TABLES: Each table should be on a separate sheet, numbered consecutively, with a legend. The writing method admitted is WORD, EXCEL..

GRAPHICS AND DRAWINGS: Separated from the text, should be lettered on white or glossy paper, in black and white in compatible disks TIF or JPGE format. They should be clearly “constructed”, with sufficiently big letters within the block of the graph.

ILLUSTRATIONS: Photographs should be numbered and lettered.

NOTES: They should be numbered and referred to in the text. They should be compiled on separate sheets.

LENGHT: Preferably between 5 (min.) and 25 (max.) typed pages. The number of illustrations, tables and graphs should be proportional to the lenght of the text.

The articles are reviewed by the editorial staff to be conformed for their publication.

<http://publicaciones.ua.es>

La ecología del paisaje es una rama reciente de la ecología que ofrece teoría y métodos para explicar las dinámicas ecológicas de grandes áreas y abre nuevas perspectivas sobre los problemas relacionados con la gestión de los ecosistemas y la planificación del uso del territorio. La atención de la ecología del paisaje se centra en la identificación de las causas y las consecuencias de la heterogeneidad espacial, que es fruto de complejas interacciones entre la biota y el ambiente, además de en la actividad humana que ha contribuido desde tiempos prehistóricos a los cambios del paisaje y es responsable actualmente de profundas y repentinas alteraciones. El punto de vista de la ecología del paisaje integra el contexto natural con el contexto humano y centra su atención en lo que Almo Farina denomina “el

mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos antrópicos. Los ambientes influidos por el hombre han sido durante largo tiempo cosecha ignorada por los ecólogos porque resultaban poco atractivos desde el punto de vista naturalista; sin embargo son precisamente los “paisajes culturales” (es decir, áreas moderadamente modificadas por el hombre que comprenden elementos naturales) los que proporcionan la clave para la comprensión de los procesos que llevan a la integración entre las realidades naturales y la realidad humana.

Almo Farina está profundamente convencido de que el conocimiento de los procesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los ambientes modificados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emergen de los sistemas naturales.

La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de integración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confiere al autor de este texto una carga de entusiasmo que se traduce en una presentación apasionante de la disciplina. Al interés intrínseco de los argumentos cabe añadir: a) la simplicidad del lenguaje específico que facilita la comprensión; b) una serie de ejemplos de muchas de ellas referidas a los ambientes montañosos de los Apeninos donde el autor ha realizado gran parte de sus investigaciones) que esclarecen el corpus doctrinal presentado pero que, en definitiva, son puramente mediterráneos; c) la continua referencia a los argumentos relacionados y a sus aplicaciones.

Una excelente publicación de ecología espacial de la Universidad de Alicante

**IBTISSEM, Bensenane; NOURY, Benabadji;
B-EDDINE, Ghezlaoui et RAHMA, Berkouki**

**Un écosystème steppique anthropisé
(cas de la région d'El-Gor, Algérie,
occidentale)**

Portada

Créditos

Résumé	221
Summary	223
Introduction.....	224
1. Situation géographique de la commune d'El-Gor (carte)	228
2. Matériels et méthodes d'étude	230
3. Résultats	232
Sols de la région.....	254
4. Flore de la région.....	254
Discussion	263
Conclusion.....	265
Références bibliographiques	268
Notas	278

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

IBTISSEM, Bensenane (1); NOURY, Benabadji (2);
B-EDDINE, Ghezlaoui et RAHMA, Berkouki

Résumé

L'objectif de notre étude est de mettre en évidence l'importance de l'action anthropozooïque sur la région steppique de la commune d'El-Gor à travers une approche anthropique. Nous avons visé l'étude de la dynamique des écosystèmes naturels dans cette commune jugée représentative des régions steppiques. Elle a subi d'énormes modifications dues principalement à l'action de l'homme, de l'animal et du climat.

A travers cette étude nous avons à présenter le cadre bioclimatique. Pour cela il a été fait appel aux données météorologiques (températures et précipitation) pour effectuer la synthèse bioclimatique des indices classiques (Diagramme

ombrothermique, Climagramme pluviométrique d'Emberger). La période récente (1984-2009) varie nettement par rapport à l'ancienne période (1913-1938) avec une diminution des précipitations et une augmentation des températures, donc les stations météorologiques évoluent vers les étages plus secs.

L'étude du couvert végétal montre une diminution des espèces vivaces avec une prolifération de plus en plus des espèces annuelles (les herbacées annuelles comptent 56.16%, viennent en second lieu les herbacées vivaces avec un taux moyen de 34.25% et en dernier nous avons les espèces ligneuses avec un très faible pourcentage de 9.59%) à cause du surpâturage les parcours de pacages sont passés de 21 965 ha à 900 ha en seulement dix ans, ainsi que le défrichement afin d'installer la céréaliculture sa superficie est passée de 8 000 ha en 1997 à 9 250 ha en 2010, et sa production a connu une chute (10 816 Qx/ha en 1997 à 30 350 Qx/ha en 2007), cette situation contribue fortement à la régression du patrimoine végétal.

Mots clés : Action anthropique, Dégradation végétale, Steppe, Bioclimat, El Gor (Algérie).

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

Summary

Our study objects to obviously shed the light on the importance of the anthropozooic action on the steppe region of Al-Gor through an anthropic approach. The aim was to study the natural ecosystem dynamics in this area expected and evaluated to be representative of the steppe regions. It has undergone important modifications due principally to climate, animal and human actions.

Through this study we present the framework to bioclimatic. For this meteorological data are needed (temperature and precipitation) for synthesizing traditional bioclimatic indices (Ombrothermic figure, Emberger's rainfall climagramme). The recent period (1984-2009) varies significantly from the previous period (1913-1938) with reduced rainfall and higher temperatures, so the weather stations are moving towards the drier floors.

The study of vegetation cover shows a decrease in perennial species with a growing proliferation of annual weeds (annual grasses have 56.16%, come second to perennial herbs with an average of 34.25% and finally, the woody species with a very small percentage of 9.59%) because of overgrazing rangelands of pastures increased from 21 965 ha to 900 ha in just ten years, and land clearance to install the cereal cul-

ture. (Surface area increased from 8,000 ha in 1997 to 9,250 ha in 2010, and production has plummeted (10,816 in 1997 to 30,350 Qx/ha in 2007) this contributes significantly to the regression of plant heritage.

Key words: anthropic actions, plant degradation, steppe, bioclimate, Al-Gor (Algeria).

Introduction

Les piémonts des versants montagneux et ceux des hautes plaines ont été depuis fort longtemps le théâtre d'une dégradation continue exercée par le pastoralisme et l'agriculture, ce qui aboutie à une désertification. Celle-ci résulte d'un déséquilibre dans les interactions dynamiques entre plusieurs éléments dans l'écosystème, le climat, le sol, la végétation et l'homme (El Zerey Wael, 2009).

La régression du couvert végétale de la région méditerranéenne a fait l'objet de plusieurs études au cours des dernières années. Elle a été la préoccupation de plusieurs chercheurs scientifiques notamment: Tomaselli (1976), Barbéro et Quezel (1979, 1980), Nahal (1984), Le-Houerou (1988), Bouazza (1990, 1995), Barbero *et al.*, (1990), Bouabdellah (1992), M'Hirit et Maghnouj (1994), Quezel *et al.*, (1994), Skouri (1994), Le-Houerou (1995), Benabadji (1999), Quezel

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

(1999), Mazzoleni *et al.*, (2004), Kadik et Godron, (2004), Aidoud *et al.*, (2006).

En Afrique du Nord, la végétation est de plus en plus menacée par l'accroissement démographique et une surexploitation des parcours qui entraînent une forte régression de cette couverture. La steppe algérienne, depuis plus d'une trentaine d'années, connaît une dégradation de plus en plus accentuée de toutes les composantes de l'écosystème (flore, couvert végétal, sol et ses éléments, faune et son habitat) (Le– Houérou, 1985 ; Aidoud, 1996). La wilaya de Tlemcen qui inclut la région d'El-Gor compte aujourd'hui parmi les 12 wilayas affectées par le phénomène de la désertification. Mais ce phénomène y est plus récent. Ceci est dû à des causes autant humaines (surpâturage, surexploitation des ressources pastorales, sédentarisation massive des semi-nomades...), que naturelles (sécheresse, érosions hydrique et éolienne).

Il est à remarquer que les processus de démotorisation (débroussaillage des ensembles préforestiers) et de désertification comme la dégradation de la végétation puis l'érosion de la couche de terre semblent s'accélérer dans la région. Cela a été montré par un certain nombre d'auteurs (Aidoud, 1996; Benabadji et Bouazza, 2002; Bouazza *et al.*, 2004). Par ailleurs la ressource végétale, bois ou biomasse fourragère,

n'est pas épargnée, elle connaît une certaine régression, et est en voie de disparition affectant le tapis végétal durant ces dernières décennies dans la région est donc liée à l'action anthropique, mais aussi à l'évolution du bioclimat. Ce dernier, est un facteur majeur dans la dégradation du couvert végétal voir l'exclusion totale de certaines espèces d'un milieu à un autre. Selon Lucas (1942), il est connu pour jouer un rôle dans la répartition des formations végétales, et son irrégularité dans le temps impose souvent aux plantes des conditions de vie difficile surtout quand il y a un manque de précipitations.

La pression anthropique croissante et les changements rapides ont fait ressortir l'intérêt et la nécessité du suivi à long terme dans le cadre de programmes internationaux Mab/Unesco (Aïdoud *et al.*, 2006).

La steppe de la wilaya de Tlemcen comme toutes les steppes algériennes est exposée à la désertification, qui semble désigner la dégradation des terres dans les zones arides, semi-aride et subhumide par suite de divers facteurs, parmi lesquelles les variations climatiques et les activités humaines (Anonyme, 1994). Parmi ces activités, on peut citer: le défrichement, l'éradication des espèces ligneuses, l'augmentation de la densité de la population, ainsi que l'action l'anthro-

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

pozoogène (surpâturage et agriculture), toutes ces actions sont néfastes pour la végétation et génèrent une dynamique régressive des parcours steppiques.

Quelles sont les différentes actions anthropiques exercées dans cette région ?

Existent-ils des explications pouvant répondre aux préoccupations d'ordre socio-environnementales dans un premier temps, cette explication combien même difficile à résoudre pourra-t-elle aussi dans un second temps parer au phénomène de désertification ?

Dans cette région, les études menées jusqu'à maintenant sont très fragmentaires et manquent cependant de précision. Devant cet état de fait nous serons exposés à procéder à des quantifications in-situ en vue de cerner le problème en question. Afin de tenter d'approcher ces aspects et probablement répondre à des attentes, nous développerons successivement:

- Situation géographique,
- Matériel et méthode d'étude,
- Méthodologie de travail,
- Choix de la région,
- Résultats,

- Bioclimatologie de la région,
- Anthropisation de la région ou la dégradation annoncée de l'écosystème steppique,
- Flore de la région.

1. Situation géographique de la commune d'El-Gor (carte)

Elle est située entre 1°59' et 1°58' de longitude Ouest et entre 34°50' et 34°57' de latitude Nord. La commune se trouve à l'extrême Sud-est de la wilaya de Tlemcen. La partie Nord appartient aux piémonts sud de la wilaya, et présente un couvert végétal formé en majorité par un matorral arboré dégradé. La partie sud, soit, près de 80% du territoire communal est représenté par les hautes plaines steppiques caractérisées par un couvert végétal éparse à *Stipa tenacissima* et *Artemisia herba-alba* souvent dégradé et des parcours steppiques fortement pacagés.

L'agglomération d'El-Gor est située à :

- 53Km du chef lieu de la wilaya de Tlemcen,
- 18Km du chef lieu de la Daïra de Sebdou,
- 36Km de Ras-El-Ma et 35Km de Moulay-Slyssan.

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

Carte1 : Situation géographique de la commune d'El-Gor

Elle couvre aussi une superficie totale de 79 258 Ha. Cette commune relève de la Daïra de Sebdou, suite au dernier découpage administratif, elle est limitée comme suite :

- Au Nord par la commune de Beni-Semiel,
- A l'Est par la commune de Ras-El-Ma,
- A l'Ouest par la commune de Sebdou,
- Au Sud par la commune d'El Aricha.

2. Matériels et méthodes d'étude

Chaque relevé doit porter une aire au moins égale à l'aire minimale (Braun-Blanquet, 1952; Gounot, 1969 et Djebaili, 1984).

Selon Gounot (1969) et Daget (1989), les études écologiques sont fondées sur des relevés floristiques de terrain, l'échantillonnage est la première phase du travail et toute la suite en dépend, et il est important que la surface des relevés soit suffisante pour comprendre la quasi-totalité des espèces présentes sur la surface considérée de végétation floristiquement homogène (Guinochet, 1973).

On a réalisé 50 relevés floristiques sur les piémonts matorralisés et les steppes. Les espèces récoltées ont été identifiées à partir des flores de Quezel et Santa (1962), de Bonnier (1990) et de Ozenda (1977).

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

2.1. Méthodologie de travail

- Les données floristiques : sont obtenues par les relevés floristiques, effectués selon la loi de l'aire minimale de Gounot (1969) et celle de Braun–Blanquet (1952).
- Les données climatiques : Les précipitations et les températures moyennes annuelles pour les deux périodes 1913–1938 et 1984–2009 nous ont été fournies respectivement par Seltzer (1946), les données récentes nous ont été mises à notre disposition par les services de météorologie. Toutes ces données ont fait l'objet d'une exploitation à partir d'indices bioclimatiques (diagrammes ombrothermiques de Bagnouls et Gaussen et le climagramme pluviométrique d'Emberger.
Selon Bagnouls et Gaussen (1953), un mois est dit biologiquement sec si le total mensuel des précipitations exprimées en millimètre est égal ou inférieur au double de la température moyenne, exprimée en degrés Celsius ($P \leq 2T$).
- Données socio-économiques : Sont obtenues à partir du recueil des données démographiques pour les trois périodes 1987, 1998 et 2008. Elles proviennent de l'ANAT (agence nationale pour l'aménagement du territoire). Les données

relatives aux activités pastorales et agriculture nous ont été remises par la direction des services agricoles.

2.2. Choix de la région

La station, selon Emberger (1955), dépend impérativement de l'homogénéité de la couverture végétale dans le but d'éviter des zones de transition.

On a choisi la région d'El-Gor qui a été jugée représentative à cause des actions anthropique et anthrozoogène qui lui sont imposées.

3. Résultats

3.1. Bioclimatologie de la région

En raison du manque de données fiables concernant la pluviométrie de la station elle-même (les prélèvements ne se font pas régulièrement), ainsi que l'absence des données de la température. On a été obligé de se référer aux stations avoisinantes et qui encadrent la région, ce sont El-Aricha et Ras-El Ma pour pouvoir mener cette approche bioclimatique.

3.1.1. Aperçu général

Le climat est un facteur très important en raison de son influence prépondérante sur les hautes plaines steppiques.

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

Beaucoup de travaux sur la climatologie et la bioclimatologie ont été réalisés sur l'Algérie en général et la région steppique en particulier Seltzer (1946), Emberger (1955), Le-Houerou *et al.*, (1977), Stewart (1975), Alcaraz (1982), Djebaïli (1984), Benabadji et Bouazza (2000). L'ensemble de ces auteurs s'accordent à reconnaître l'appartenance du climat algérien au climat méditerranéen.

La région se caractérise par de faibles précipitations (< 300 mm par an) avec de grandes variabilités intra et inter annuelles. Compte tenu du manque de données dans les postes météorologiques nous avons considéré uniquement deux stations avoisinantes (en possession de données météorologiques complètes) encadrant la région, il s'agit de El-Aricha et Ras-El-Ma pour mener cette approche bioclimatique.

3.1.2. Diagrammes ombrothermiques

Les diagrammes ombrothermiques de Bagnouls et Gaussen (1953) permettent de comparer l'évolution des valeurs des températures et des précipitations. À ce sujet Emberger (1942) précise : « un climat peut être météorologiquement méditerranéen, posséder la courbe pluviométrique méditerranéenne caractéristique, sans l'être écologiquement ni biologiquement, si la sécheresse estivale n'est pas accentuée ».

Figure n°1 : Diagrammes ombrothermiques de 1913-1938 et 1984-2009 des deux stations El-Aricha et Ras-EI-Ma

On constate que les stations sont marquées par une saison sèche. Les anciennes périodes (1913-1938) montrent des sécheresses qui s'étalent du mois d'avril au mois de septembre pour les deux stations d'El-Aricha et Ras El Ma, soit une durée de 6 mois dans l'année en moyenne.

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

On observe aussi une accentuation de la sécheresse au niveau des nouvelles périodes surtout El-Aricha elle s'étale du mois de mars jusqu'à fin octobre début novembre soit 8 mois dans l'année, en revanche elle est un peu moins longue dans la station de Ras El Ma car elle débute fin mars début avril et se prolonge jusqu'au mois d'octobre pour les périodes récentes (1984–2009).

Sur le terrain cette sécheresse se traduit sans surprise par des modifications relativement importantes de la composition floristique ; modifiant ainsi le paysage en imposant une végétation xérophile.

3.1.3. *Quotient pluviométrique d'Emberger*

Pour établir ce climagramme, Emberger se base sur les séries de végétations qui sont des groupements végétaux ayant les mêmes aptitudes écologiques.

Le-Houérou *et al.*, (1977) considèrent que les steppes algériennes sont encadrées par les isothermes « m » – 2 et 6 °C, et que l'amplitude thermique ; M-m varie peu et reste sensiblement égale à 34,6 °C. Ces températures expliquent l'absence de certaines espèces dont la vie est liée aux hivers tempérés.

Figure n°2 : Quotient pluviométrique d'Emberger pour les deux stations

Les deux stations El-Aricha et Ras El Ma ont été installées sur le climagramme grâce au Q_2 d'Emberger ($Q_2=2000P/M^2 \cdot m^2$). Aussi on constate que nos deux stations accusent un déplacement vers la droite, dans la première station (El-Aricha), de même qu'il se produit un décrochement de l'été

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

semi aride inferieur vers l'étage aride moyen à hiver froid. La deuxième station décroche elle du semi aride moyen à hiver frais vers l'aride moyen à hiver tempéré.

3.2. Anthropisation de la région ou la dégradation annoncée de l'écosystème steppique

3.2.1. Parcours et pacages

D'après Long (1960), un terrain de parcours peut être constitué par toute l'étendue d'un territoire sur lequel le bétail consomme l'herbe de toutes sortes de groupements végétaux librement et sans contrôle.

Tableau n°1: Parcours et pacages dans la région d'El-Gor par ha (1999, 2009)

Années	Parcours (ha)
1999	21965
2009	900

Source : Direction des Services Agricoles (2012) (D.S.A.)

En faisant la comparaison entre des données des parcours des deux années, on remarque qu'il ya une très forte régression de la superficie, elle est passée de 21965 ha à 900 ha soit une réduction de 21 065 ha en seulement dix ans soit une réduction 21 065 ha. On peut expliquer ce recule par

Figure n°3 : Les parcours et pacages par ha (1999 et 2009)

Photo n°1 : État physiologique de pâturage (El Gor le 27/03/2011)
photo: Bensenane.

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

la forte pression anthropique et anthrozooïque qui sont les principales causes de la dégradation du couvert végétal qui semblent agir dans la région.

3.2.2. Surpâturage

Le surpâturage tel que définit par Le-Houerou (1968) consiste à prélever sur une végétation donnée une qualité de fourrage supérieure à la production annuelle.

La composition du tapis végétal riche en espèces palatables, joue un rôle primordial dans le choix du cheptel. A ce sujet Bouazza (1990) souligne que les animaux choisissent les espèces et par conséquent imposent à la biomasse consommable offerte une action sélective importante. Le même auteur Bouazza (1995) ajoute que ces ressources fourragères sont liées aux formations de *Pinus halipensis*, *Quercus ilex*, *Rosmarinus officinalis* et *Juniperus oxycedrus*.

Tableau n° 2: Répartition du cheptel par têtes dans la zone d'étude en 2009-2010

El-Gor		
Bovin	Ovin	Caprin
950	24300	1410
Total= 950 +24300 +1410= 26660têtes		

Source : D.S.A. (2011)

Figure n°4: Répartition du cheptel par têtes dans la zone d'étude en 2009–2010

Le surpâturage est dû à l'accroissement du cheptel lié à une réduction de l'offre fourragère. On remarque d'après les secteurs ci-dessus que l'effectif du cheptel, pâturent en zones steppiques d'El-Gor et dont la composante prédominante est l'espèce ovine (environ 91% du cheptel). Elle est assez importante ce qui peut entraîner un impact négatif sur la régénération végétale sachant que les troupeaux sont de petite taille car plus de 70% des propriétaires possèdent moins de 100 têtes et 90% des populations ovines appartiennent à des éleveurs privés (D.S.A. 2011).

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

Dutoit (1999), a signalé que quelques caprins sont régulièrement inclus dans les troupeaux d'ovins, avec un rôle non seulement de guider le troupeau mais aussi de lui donner l'exemple en s'attaquant aux broussailles et les espèces herbacées coriaces, ce qui fait que malgré son faible taux (5%) seulement il reste très important pour le pasteur. Aussi l'élevage de caprin constitue pour l'éleveur, un revenu moyen, un cheptel rustique et rentable de par son coût unitaire et sa performance au froid et aux maladies ainsi que sa capacité d'adaptation. Par contre l'élevage de bovin constitue un capi-

Photo n°2 : Touffes d'alpha (*Stipa tenacissima*) dégradé à cause du surpâturage (El-Gor) le 16/03/2011, photo: Bensenane.

Photo n ° 3: Surpâturage et abreuvement pour bétail. (El-Gor) le
27/03/2011, photo: Bensenane.

tal à la fois économique et symbolique pour l'éleveur ayant atteint un certain degré d'aisance mesuré au départ en termes de troupeaux d'ovins possédés (Haddadou et Benzadi, 1993).

3.2.3. *Défrichement*

Quezel (2000) a souligné que sur les hauts plateaux, les défrichements sont les plus importants. Ils affectent au moins 1% des surfaces forestières totales chaque année dans les pays du Maghreb. Ce processus est défini comme une implication totale de la végétation d'une zone pour utiliser ces

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

terres à d'autres intérêts comme l'agriculture, l'élevage ou l'urbanisme.

Photo n°4 et 5 : Défrichement et installation de la céréaliculture.
(El-Gor, 27et 22/03/2011 respectivement, photo: Bensenane.

Tableau n°3: Production végétales (culture herbacée)

El Gor	Céréales		Fourrages		Légumes secs		Cultures maraîchères	
	Superficies ha	Production QX	Superficies ha	Production QX	Superficies ha	Production QX	Superficies ha	Production QX
1996-1997	8000	10816	250	600	-	-	-	-
2006-2007	3 650	30 350		-	-	-	-	-

Source : Monographie de la wilaya de Tlemcen (2011)

Le tableau comme les photos montrent que la culture des céréales et des fourrages sont très répandus dans la région, ces cultures sont très importantes et accusent des variations en production (Figure 5). Par ailleurs ces cultures interviennent

Figure n°5: Evolution de la production céréalière de 2 campagnes agricoles espacées de dix années.

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

dans la vie du pasteur car elles représentent un apport financier secondaire outre que l'élevage.

3.2.4. Eradication des espèces ligneuses

Les besoins en combustible quotidien à des fins domestiques poussent la population de la steppe à couper et déraciner les espèces ligneuses d'une manière intensive, ce qui augmente la dénudation de la surface du sol pour conséquence la désertification qui est une augmentation rapide et parfois irréversible des milieux arides et semi arides sous l'effet d'une exploitation excessive de leurs ressources naturelles, provoquant l'installation des conditions de plus en plus défavorables aux êtres vivants, comme il en existe dans les véritables déserts pouvant induire à la stérilisation de ce dernier.

Une évaluation de ce type de destruction des ressources végétales de la steppe en Afrique du Nord est réalisée par Le-Houerou (1979), et montre qu'un niveau de destruction théorique atteint l'ordre de 5 à 7 millions d'hectares sur environ 500 millions d'hectares de steppe soit de 1 à 1.5% /an. En considérant qu'il ya une certaine régénération une année sur deux, le taux de destruction annuel des espèces ligneuses reste élevé avec une surface globale de 500 000 à 700 000 ha (Barkouki, 2007).

Tableau n°4 : Strates existantes dans notre zone d'étude.

Station	Herbacées annuelles		Herbacées vivaces		Ligneuses vivaces	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
El Gor	42	82.35	6	11.46	3	5.88

Figure n°6 : Pourcentage de type morphologique

D'après le graphe, on observe une dominance des herbacées annuelles par rapport aux autres strates existantes dans la région avec un taux de 83%, et qui induit une dégradation de la végétation (Arbelot, 1979). Elle implique la référence à un état optimal qui est rarement connu dans la région méditerranéenne.

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

Photo n°6 : Eradication des espèces ligneuses. (El-Gor) le 27/03/2011, photo: Bensenane.

néenne. Cela peut s'expliquer par l'arrachage des plantes à des fins personnelles ou pour l'installation de la céréaliculture.

D'après la carte on remarque que le territoire de la commune est dominé par des parcours alfatiers dégradés qui sont localisés en particulier dans le Sud et le Sud-est, en revanche le Nord, est caractérisé par des formations à matorrals, et en ce qui concerne l'Ouest, on observe la présence de parcours à régénérer.

Carte n°2 : Aménagement de la commune d'El Gor

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

3.2.5. Incendies

Les dommages dus aux incendies de forêt font l'objet de plusieurs écrits. Selon Delabrazé (1985), Le-Houerou (1980), Tatoni et Barbero, (1990), les incendies constituent une perturbation majeure des paysages méditerranéens. Cependant ce problème dont l'extension est dramatique dans certains pays Méditerranéens du Nord, reste moderne dans notre zone d'étude en raison de l'impact du pastoralisme, et ne touche que les versants montagneux de la région.

La fréquence et l'intensité ainsi que la saison d'occurrence d'un feu permettent le maintien ou l'élimination de certains taxons végétaux. Après l'incendie toute la végétation est détruite, ce n'est qu'à la deuxième année que la strate buissonnante atteint un taux de recouvrement voisinant 20% ou dominant les Cistacées (*Cistus ladaniferus*) suivis de *Rosmarinus officinalis*, de *Globularia alypum* et des Herbacées (Bestaoui, 2001).

3.2.6. Evolution de la population steppique de la région

L'influence de la population sur le milieu naturel et sa répartition dans ce milieu sont des évidences. D'après Locatelli (2000), une population trop importante (taux de croissance

élevé) dégrade l'environnement et les moyens de sa production, comme le sol.

Afin de comprendre l'effet de l'action de l'homme, qui affecte considérablement notre zone d'étude, nous avons jugé nécessaire d'étudier l'évolution de la population durant les cinq dernières décennies.

**Tableau n°5: Evolution de la population d'El-Gor
(Habitant)**

Années commune	1966	1977	1987	1998	2008
El Gor	4459	6222	6089	7708	8958

Source : (A. N. A. T., 2012)

D'après la figure 5 on observe une évolution pratiquement linéaire de la population steppique qui peut avoisiner les milles habitant chaque décennie ce qui a un effet très remarquable sur la végétation steppique à cause de toute l'infrastructure installée à fin de faciliter la vie au quotidien des habitants sans oublier le taux de chaumage qui atteint les 85%, ce qui pousse la population à ce convertir vers le pastoralisme.

La croissance démographique concerne aussi bien la population sédentaire que la population éparse. Cependant, il y a une importante régression du nomadisme qui ne subsiste que

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

Figure n°7: Evolution de la population de la zone d'étude de 1966 à 2008.

de façon sporadique (Khaldoun, 1995). Cela conduit à une surexploitation des ressources pastorale; donc les pasteurs ont modifié leur système de production en associant la culture céréalière et l'élevage.

La sédentarisation des populations conduit à la surcharge pastorale sur des surfaces parfois de plus en plus réduites et provoque une dégradation accélérée du milieu naturel, notamment par compactage des sols (Benabadji *et al*, 2009).

Traditionnellement la pratique du pastoralisme dans la steppe était soumise à l'existence d'un droit nomade coutumier basé sur l'obligation de rotation dans la steppe. Les éleveurs et nomades changeaient de parcelles de parcours chaque année selon une organisation bien maîtrisée et ce afin d'assurer la reconstitution du couvert végétal naturel. Or la disparition de ce droit vers la fin des années 70, entraîne un bouleversement total de la steppe où depuis, tout le monde a droit de mener son troupeau là où il veut et surtout quand il veut. Ainsi que la motorisation des moyens de transport qui facilitent l'accessibilité dans des zones jugées jadis difficile, et les conséquences se traduisent par la destruction de la steppe.

La carte n°3 montre une importante population qui se concentre au niveau du chef lieu de la commune, ainsi qu'une population éparse et semi-nomade un peu partout dans le reste de la commune. En effet le chef lieu exerce sa polarité sur l'ensemble de l'espace communal en raison de son niveau d'équipement relativement important malgré le manque important en ce qui concerne le secteur de travail (le taux de chaumage a atteint les 85% en 2007).

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

Carte n°3: Répartition de la population.

Sols de la région

Sans entrer dans les détails nous pouvons signaler que les études édaphiques sur la région méditerranéenne sont nombreuses on cite; Ozenda, 1954; Monjaube *et al.*, 1955; Quezel, 1964; Djebaili, 1978; Aidoud et Nedraoui, 1982; Benabadji *et al.*, 1996.

Duchaufour (1977); souligne entre autre que le sol est une réserve de substances nutritives et un milieu stable pour l'activité biologique. Il a aussi bien précisé que tous les sols qualifiés de steppiques appartiennent à la classe des sols isohumiques (sols bruns de steppe).

4. Flore de la région

Les relevés floristiques ont été réalisés dans deux stations différentes jugées représentatives. Elles se présentent comme suit :

Station 1 (Tableau 8) : elle est très faible en composition floristique, car il ya plus de céréalicultures.

- **Strate arborée** : Est très pauvre en couverture végétale, représentée par juste deux espèces *Juniperus oxycedrus* et *Pinus halepensis*.

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

- **Strate arbustive** : Beaucoup moins développée par rapport à la deuxième station à cause du surpâturage et de la culture céréalière qui lui sont imposés. Il n'existe que sept espèces.

Tableau n°6 : Espèces de la strate arbustive et leur présence dans la station n°1

Espèces	Présences
<i>Asparagus acutifolius</i>	2
<i>Chamaerops humilis</i>	1
<i>Cistus albidus</i>	4
<i>Daphne gnidium</i>	4
<i>Genista tricuspidata</i>	2
<i>Globularia alypum</i>	3
<i>Ulex boivinii</i>	2

- **Strate herbacée** : Elle est plus développée car elle comporte 18 espèces comme *Asphodelus microcarpus*, *Bromus rubens*, *Paronychia argentea*...etc.
- **Station n°2** (Tableau n°9) : Cette station est plus riche en espèces par rapport à la première car elle se localise plus loin du chef lieu de la commune et se situe au Nord-est.
- **Strate arborée** : Elle est relativement faible et représentée par trois espèces.

Tableau n°7 : Espèces dominantes et leur présence dans la deuxième station

Espèces	Présence
<i>Juniperus oxycedrus</i>	12
<i>Pistacia atlantica</i>	10
<i>Pinus halepensis</i>	6

- Strate arbustive : Est bien développée, on remarque la présence de onze espèces avec une dominance de : *Asparagus acutifolius*, *Cistus villosus* et de *Calycotome spinosa*.
- Strate herbacée : Bien développée, elle est représentée par 28 espèces, on note : *Plantago ovata*, *Urginea maritima* et *Asphodelus microcarpus*.

Tableau n°8:

La première station : A 4Km d'El Gor, Surface 100m²
Altitude : 1200m Exposition : Est-Ouest Pente : 15 à 20%
Taux de recouvrement 20 à 30%

Numéros de relevés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Présence
Espèces																										
Strate arborée																										
<i>Juniperus oxycedrus</i>	3						+								1											3
<i>Pinus halepensis</i>	+			1																				2		3
Strate arbustive																										
<i>Asparagus acutifolius</i>	+										1															2

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

<i>Chamaerops humilis</i>																		+	1
<i>Cistus albidus</i>			3					3						1			+		4
<i>Daphne gnidium</i>			1				+				2	2							4
<i>Genista tricuspidata</i>													1					+	1
<i>Globularia alypum</i>	2	1	2			+			1	2		+			3	3	1	1	2
<i>Ulex boivinii</i>				2		+													2
Strate herbacée																			
<i>Alyssum campestre</i>	+			1			+			1			+						1
<i>Asphodelus microcarpus</i>	+	1	2	2	+	+		1	2	2		1	1	1	+	+	+	1	21
<i>Bromus rubens</i>	+	2							+			1						+	2
<i>Chrysanthemum grandiflorum</i>	1	1	+			2	1	3	3	3	2		+			1	1	1	1
<i>Echinops spinosus</i>	+								+					1	1		3	3	1
<i>Echium pycnanthum</i>	1	+				+	1	1	1	1		2	2	2	3	1	1	1	1
<i>Ferula communis</i>	1		2			+					1	2		+				1	1
<i>Hordeum murinum</i>	+			1			+				1				+				1
<i>Marrubium vulgare</i>	+	+	+	1	1	1		+					+				1		
<i>Medicago minima</i>		+							+		1	1	1	2		1		+	1
<i>Micropus bomicynus</i>					3		+		+										+
<i>Paronychia argentea</i>					+	+	1	1	1	1		1	2	1		+	+	+	1
<i>Plantago albicans</i>	+	1	2				+						+			1	1		1
<i>Reseda alba</i>	+						+						+	+					

Ibtissem, Bensenane; Noury, Benabadji; B-Eddine, Ghezlaoui et
Rahma, Berkouki

<i>Salvia verbenaca</i>	1				+			1						3	+						+	6
<i>Schismus barbatus</i>	2	1	2		1			+						+	1		1			2		9
<i>Sinapis arvensis</i>		2						+		1	2		+				1		1			7

Tableau n°9 :

La deuxième station : A 7 Km d'El Gor, Surface 100 m²
Altitude :1150 m Exposition : Nord-Est Pente 15à 20% Taux
de recouvrement 25 à 40%

Numéros de relevés Espèces	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Présence
	Strate arborée																									
<i>Juniperus oxycedrus</i>	+			+	1		2	+			+	1			+			2		+	+			3		12
<i>Pinus halepensis</i>	3					3				2						1	1								+	6
<i>Pistacia atlantica</i>	2	+		1		3			1		+		2	2					1					1		10
Strate arbustive																										
<i>Asparagus acutifolius</i>		+	+					+	+		+	1		+	+			+				2				10
<i>Asparagus albus</i>			3		2					1	1	1		+			1							+		8
<i>Atractylis cardius</i>				1	+			2		+								+				3				6
<i>Atractylis humilis</i>	+		1			+		2									1	+								6
<i>Calycotome spinosa</i>	+	+			1	1		+	+			+	1	+	+		+	1		+						13
<i>Cistus villosus</i>	+	+	+		+			+		+	1		+	+	+		1	+		+		+	+	+	+	16
<i>Globularia alypum</i>	+							+									+							1		4
<i>Helianthemum caputhelis</i>	1	+		1						+			1						1			+				7
<i>Rosmarunis officinalis</i>	+	1						2						3						3					+	6
<i>Thymus ciliatus</i>	1				+							1									2			3		5
<i>Ulex boivinii</i>	2		3					2				+						1								5

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

Strate herbacée																			
<i>Alyssum campestre</i>	1		+										1		2			+	5
<i>Asphodelus microcarpus</i>	+	+	+	+	1	+	+	+	+	1	+	2	+	+	+	+	+	+	23
<i>Brachypodium distachyum</i>	+	1		1		2	1		+	+	2	+		+	1	1			12
<i>Bromus rubens</i>	+		1		+									2			+		6
<i>Chrysanthemum grandiflorum</i>		+		3				+	1		1				+	+			7
<i>Convolvulus arvensis</i>	+				+		3		2						1			1	8
<i>Convolvulus tricolor</i>		+						+	1		1								4
<i>Daucus carota</i>	1			+			+				+	1				2	2		9
<i>Echium plantagineum</i>	3	3			+			+				2			+		1		8
<i>Erodium molachoides</i>							3								1			+	3
<i>Erodium moschatum</i>			2				1	+				1		+			2		7
<i>Ferula communis</i>	+	+			2			1					1	3	2		1	1	12
<i>Hedypnois cretica</i>				1	1	2	+		1		2			+	1	1		1	12
<i>Hordeum murinum</i>	+				1		+			2				+					6
<i>Lobularia maritima</i>	2	2	+		+	3		+		2			+	+				1	12
<i>Malva sylvestris</i>		1	1	2	2			+	3		3		+	+		1		+	12
<i>Medicago orbicularis</i>	1	1	2				3		+			+		+		3		+	10
<i>Micropus bombycinus</i>	1					+			1			+				1			6
<i>Papaver rhoeas</i>	+		2					+		1						1		+	6
<i>Plantago ovata</i>	+	1	+	+		+		+			+	1	+	+		+	+	+	16
<i>Plantago lagopus</i>	2	2	1	+		2		+		2			1	+	+		+	1	14
<i>Reseda alba</i>	2	1	1	+	+	+	2	2	+	+	+	1	1	1	+	+	+	+	23
<i>Salvia verbenaca</i>		+						+					+						4
<i>Scabiosa stellata</i>	3	3	3	1		+				2	2		1	+	+		+	1	14

<i>Schismus barbatus</i>	1	1	1	+		1	3		+	1	2			+	+	+	1	2		2	2	3				17
<i>Sinapis arvensis</i>		+		1	1	1	+		1		1	+		+	1	1						+	+	+	+	15
<i>Stipa tenacissima</i>	+		+			+		1	1		1				+	+	+			1		+	+	1		13
<i>Urginea maritima</i>	1	3				2				3				+			+					+				7

Dans la première station on remarque l'absence de *Pistacia atlantica* et *Stipa tenacissima* qui est une espèce très prisée par le cheptel ainsi que la diminution de *Pinus halepensis* et *Juniperus oxycedrus*, sans oublier la prolifération de *Paronychia argentea* qui elle est une espèce thérophite, de *Asphodelus microcarpus* qui est une espèce représentative de la dégradation, et de *Echinops spinosus*, cette dernière est une espèce épineuse, sans intérêt, et non palatable.

Tableau n°10 : Pourcentage des types biologiques

Types biologiques	Station -1-		Station -2-	
	Nombres d'espèces	Recouvrement %	Nombres d'espèces	Recouvrement %
Phanérophytes (Ph)	02	7,69	03	7.14
Chaméphytes (Ch)	07	26.92	10	23.81
Hémicryptophyste (He)	04	15.38	03	7.14
Géophytes (Ge)	01	3.84	04	9.52
Thérophytes (Th)	12	41.15	22	52.38

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

Figures 8 et 9 : Types biologiques des deux stations

Le taux des Thérophytes (Th) est sensiblement plus élevé dans la 2^{ème} station par rapport à la première avec (52.88% contre 41.15%), ainsi les Géophytes (Ge) qui sont de 3.84 % dans la première station et de 9.52% dans la seconde, en revanche on observe une prolifération des espèces Hémicryptophytes (Hé) et Chaméphytes (Ch) dans la 1^{ère} station par rapport à la 2^{ème} station.

Tableau n°11: Pourcentage des types morphologiques

Types morphologiques	Station –1–		Station –2–	
	Nombre d'espèces	%	Nombre d'espèces	%
Herbacées annuelles (H. A.)	21	81.48	33	78.57
Herbacées vivaces (H. V.)	3	11.11	6	14.28
Ligneuses (L.)	2	4.76	3	7.41

Figures 10 et 11 : Les types morphologiques des deux stations

En ce qui concerne les types morphologiques, la 2^{ème} station est plus riche en pourcentage du point de vue herbacées vivaces (H.V) et ligneuses (L) avec des taux de 14.28 % et 7.41 % respectivement contre 11.11% et 4.76 % dans la 1^{ère} station. Contrairement aux herbacées annuelles, dont leur taux

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

est supérieur dans la 1^{ère} station par rapport à la 2^{ème} (81.48% contre 78.57%).

Discussion

Sur le plan biologique, pour Raunkiaer (1934), les types biologiques sont considérés comme une expérience de la stratégie d'adaptation de la flore, et de la végétation aux conditions du milieu. Plusieurs auteurs mettent en évidence les relations entre la distribution des types biologiques et les facteurs de l'environnement, notamment le climat (précipitations et températures), Raunkiaer (1934), Daget (1980), Danin et Orshan (1990), Floret *et al.*, (1990) proposent d'autres facteurs comme l'altitude et la nature du substrat.

Les bilans floristiques ont été obtenus à partir des relevés réalisés sur des aires minimales différentes en raison de la baisse du taux de recouvrement dans la première station (128 m² dans la 1^{ère} station et 64m² dans la 2^{ème} station), malgré l'augmentation de la surface, on n'est quand même pas arrivé au taux de la deuxième station.

En faisant la comparaison entre les inventaires floristiques réalisés, on observe une nette diminution du couvert végétal dans la station proche d'El Gor avec seulement 26 espèces,

contre 42 espèces dans la seconde station, soit une réduction de 38%.

Les actions anthropiques et anthropozooiques sont visibles dans les deux stations, car il ya présence de plusieurs espèces indicatrices de dégradation comme; *Juniperus oxycedrus*, *Asphodelus microcarpus* ainsi que des espèces épineuses non palatables, et sans aucun intérêt telles que *Ulex boivinii* qui sont présentes au niveau des deux stations avec des taux qui différent.

Au niveau de la première station la strate arborée est très affectée par la dégradation où on peut observer l'absence totale de *Pistacia atlantica*, alors qu'il est présent sur dix relevés de la deuxième station, ainsi que *Juniperus oxycedrus* qui est présent sur douze relevés de la deuxième station contre trois dans la première.

Dans la première station on remarque que le taux des Chaméphytes est plus élevé que dans la deuxième, ce qui est signe de dégradation du milieu comme l'a confirmé Kadi Hanifi (2003). La régression des formations steppiques se traduit généralement par une chaméphytisation, par des espèces dépourvues d'intérêt économique et délaissées par le bétail, inversement pour les thérophytes qui sont plus abondants dans la deuxième station, ces derniers représente une

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

forme d'adaptation au climat et aux actions anthropiques, comme l'ont signalés Daget (1980) et Barbero *et al* (1990) qui l'ont attribués ; soit à la contrainte du froid hivernal ou à la sécheresse estivale ; soit aux perturbations du milieu par le pâturage, les cultures etc. ce qui est le cas dans notre zone d'étude d'El-Gor.

Conclusion

En Algérie toutes les régions sont sensiblement affectées par le phénomène de la désertification, qui est une problématique environnementale majeure pour le 21^{ème} siècle (World Bank, 2002).

Les zones les plus exposées sont représentées par les hautes plaines steppiques, dont notre zone d'étude (El-Gor), en effet cette dernière est un milieu particulièrement vulnérable, soumis aux influences climatiques et une utilisation désastreuse des terres qui s'est traduite par l'appauvrissement et ou l'éradication des nappes alfatières (*Stipa tenacissima*) et l'armoïse blanche (*Artémisia herba alba*), comme on l'a constaté dans nos relevés floristiques (tableaux 6 et 7).

L'appauvrissement du couvert végétal semble découler de :

- L'accroissement vertigineux du cheptel, qui a comme conséquence le surpâturage, ce qui empêche la végétation de se régénérer.
- Le défrichement et l'éradication des espèces ligneuses, pour les utiliser comme moyen de combustion et pour l'installation de la céréaliculture, comme l'ont signalés Benabadji, Bouazza (2000).

L'exploitation des ressources biologiques et édaphiques des steppes a conduit à de profondes modifications du milieu nécessitant des réaménagements, à cause du surpâturage les parcours de pacages sont passés de 21965 Ha à 900 Ha soit une réduction de 21 065 Ha en seulement dix ans soit une réduction 21 065 Ha. Ceci a affecté le patrimoine végétal, dans lequel on remarque une prolifération des espèces thérophytes qui dominent par rapport aux autres types biologiques (en moyenne 45%). Ainsi que l'évolution de la population steppique qui est pratiquement linéaire et peut avoisiner les mille habitants chaque décennie, elle est passée de 4459 habitants en 1966 à 8958 habitants en 2008 soit une augmentation de 4499.

N'oublions pas aussi les facteurs climatiques qui sont déterminants pour la couverture végétale (les précipitations sont comprises entre 100 et 300 mm) comme l'a souligné (Velez, 1999)

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

en disant que les conditions climatiques ont été particulièrement défavorables au cours des années 80, caractérisées par des sécheresses, extrêmement graves, qui ont fortement agit négativement sur l'ensemble des pays du bassin méditerranéen, en particulier le Maroc, l'Algérie, le Portugal, l'Espagne et la France. D'après Le-Houérou, (1971), les conséquences du climat sont à l'origine de l'un des mécanismes essentiels de la dégradation de la végétation méditerranéenne en général. Dans nos deux stations météorologiques on observe une accentuation de la sécheresse dans la nouvelle période (1984-2009) par rapport à l'ancienne période (1913-1938). On est passé du semi aride inférieur à l'aride moyen.

Le devenir de cette steppe est lié à notre avis à la bonne maîtrise du pastoralisme, c'est pour cette raison qu'il faut sensibiliser le pasteur et l'impliquer dans la conception des projets, qu'il aura à gérer au sein de sa communauté afin d'obtenir un système productif, intégré et préservateur de l'écosystème.

D'après notre approche au niveau de cette étude, qui hélas a été courte en raison du manque de temps, sans oublier la difficulté à récolter les données fiables et récentes concernant notre région, on constate qu'il est urgent d'activer et de redynamiser le projet du code pastoral ou encore d'envisager une loi impliquant toutes les vocations (parcours, terres agricoles,

zones d'activités et de services, terrains urbanisables, sites et patrimoine à préserver...), comme l'installation de mise en défends qui est efficace pour la régénération de la steppe, cette efficacité dépend de la dynamique de l'écosystème envisagé en particulier de son anthropie, de sa résilience et de l'importance spatiale relative des écosystèmes dégradés et non ou peu dégradés, ainsi que la plantation d'arbustes fourragers et donc obtenir une grande productivité et une bonne qualité pour l'alimentation du bétail.

Références bibliographiques

- Aidoud A et Nedraoui D.**, 1982. Evaluation des ressources pastorales dans les hautes plaines steppiques du Sud oranais. Productivité et valeurs par totales des parcours. Biocénose N°2: 43-62
- Aidoud A.**, 1996. La régression de l'alfa (*Stipa tenacissima* L), graminée pérenne, un indicateur de désertification des steppes algériennes. Sécheresse, vol.7, n°3: 187-193.
- Aïdoud A, Le Floc'h E, et Le Houerou H.N.**, 2006. Les steppes arides du Nord de l'Afrique. Rev. Séch 17 (1/2) : 19– 30.
- Alcaraz C.**, 1982. La végétation de l'Ouest algérien. Thèse d'Etat, Université Perpignan, 415p + annexe.
- Anonyme.**, 1994. Nations unies., A/AC.241/27, 12 septembre 1994– Comité intergouvernemental de négociation chargé d'élaborer une convention internationale sur la lutte contre la désertification dans

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

les pays gravement touchés par sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.

Arbelot V., 1979. Essai de caractérisation des principaux stades de l'évolution de la végétation, par la distribution verticale de la phytomasse dans la garrigue montpelliéraine. Approche de la notion de dégradation. D.E.A. Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier, 33p.

Bagnouls F. et Gaussen H., 1953. Saison et indice xérothermique. Doc. Cart. Prod. Vég. Serv. Gén. II, 1, art. VIII, Toulouse: 47 p. + 1 carte.

Barbero M. et Quezel P., 1979. Les problèmes des manteaux forestiers des Pistacio rhamenetalia alaterni en méditerranée orientale. Coll.phyto. VII Liai. Forest. Lille :10-15

Barbero M. et Quezel P., 1980. Biogéographie et écologie des conifères sur le pourtour méditerranéen In pesson : Actualités d'écologie forestière. Borbas. Edit. Paris : 205-256

Barbero M., Bonin G., Loisel R. & Quezel P.,1990. Changes and disturbances of forest ecosystem caused by human activities in the Western part of the Mediterranean basin. Vegetation, 87: 151-173.

Barbero M. et Quezel P et Loisel R., 1990. Les apports de la phytoécologie dans l'interprétation des changements et perturbations induits par l'homme sur les écosystèmes forestiers méditerranéens. Forêt Méditerranéenne. XII : 194 –215.

- Barkouki R.**, 2007. Action anthropique et composition floristiques des parcours steppiques. Ing. Univ. Tlemcen, 172 p.
- Benabadji N., Bouazza M., Metge G. et Loisel R.**, 1996. Description et aspect des sols en régions semi-aride et aride au sud de Sebdou (Oranie– Algérie). Bull. Inst. Sci. Rabat n°20 :77-86
- Benabadji N.**, 1999. Physionomie, organisation et composition floristique des Atrilexaies au Sud de Tlemcen (Chott El-Gharbi), Algérie. Jour., Int., Atriplex– In– Vivo, N°8, Univ. Paris-Orsay : 1-9.
- Benabadji N. et Bouazza M.**, 2000. Contribution à une étude bioclimatique de la steppe à *Artemisia herba-alba* Asso. dans l'Oranie (Algérie occidentale). Science et changements planétaires / Sécheresse. Volume 11, Numéro 2, 117-23, Notes de recherche
- Benabadji N. et Bouazza M.**, 2002. Contribution à l'étude du cortège floristique de la steppe au Sud d'El Aricha (Oranaie– Algérie), Rev. Sci. Techn. N°17 Univ. Constantine.
- Benabadji N., Aboura R. et Benchouk F.**, 2009. La régression des steppes méditerranéennes : le cas d'un faciès à *Lygeum spartum* L. d'Oanie (Algérie). Rev. Eco. Med. Vol. 35 : 75-90.
- Bonnier G.**, 1990. La grande flore en couleur : Tomes I, II, III, IV & Index (729 planches, 1401 pages texte, 191 pages index), Ed. Belin, Paris.
- Bestaoui k.**, 2001. Contribution à une étude syntaxonomique et écologique des matorrals de la région de Tlemcen. Thèse de magister

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

en biologie.. Fac. Sci. Univ. Aboubekr Belkaid Tlemcen 184 p+ annexes.

Bouabdellah H., 1992. Degradaation du couvert végétal steppique de la zone du Sud– ouest oranais, cas d'El Aricha, Thèse de Mag en géographie, Inst. Géog. Aménag. Territ. IGAT, Univ. Oran, 222 p.,

Bouazza M., 1990. Quelques réflexions sur le zonage écologique et l'importance des facteurs édaphiques des peuplements steppiques. Communication séminaire Maghrébin Mai, Tlemcen-Algérie : 1– 10.

Bouazza M., 1995. Etude phytoécologique des steppes à *Stipa tenacissima* L., et à *Lygeum spartum* L. au Sud de Sebdou (Oranie, Algérie). Thèse. Doc. Es-Sci. Univ. Tlemcen. 153 p + annexe.

Bouazza M., Benabadji N, Loisel R, et Metge G., 2004. Evolution de la végétation steppique dans le sud-ouest de l'Oranie (Algérie). Rev. Ecol. Med. Tom 30, Fasc. 2 : 219-231.

Braun-Blanquet J., 1952. Phytosociologie appliquée. Comm. S.G.M.A.n116.

Daget PH., 1980. Elément actuel de la caractérisation du monde méditerranéen : le climat. Nat. Montp., H.s. pp :101-126.

Daget PH., 1980a. Sur les types biologiques botaniques en tant que stratégie adaptative, cas des thérophytes. In « Recherche d'écologie théorique ». Les stratégies adaptatives : 89– 114.

Daget PH., 1989. De la réalisation des plans d'échantillonnages en phytosociologie générale. Quelques algorithmes d'allocation. Bio-cénoses T.4.N.1(2) :98-118

- Danin A. et Orshan G.**, 1990. The distribution of raunkicer life fomes in israel in relation to the environnement. Journal of vegetation science1: 41-48
- Delabrazé P.**, 1985. Bases biologiques et physiques de la prévention des incendies de forêts. CNRS. Edit Piren : 1-16.
- Djebaili S.**, 1978. Recherches phytoécologiques et phytosociologiques sur la végétation des hautes plaines steppiques de l'Atlas saharien Algérien. Thèse Doct Univ Sci. Ettech. Languedoc, Montpellier 299 p + annexes.
- Djebaili S.**, 1984. Steppe algérienne phytosociologie et écologie. Alger: O.P.U. 127 p.
- Duchaufour Ph.**, 1977. Pédologie. Tome I, pédogénèse et classification. Masson et Cie Edit. Paris :477 p.
- Dutoit T.** 1999. Le pâturage itinérant dans la basse vallée de la Seine (France) : une nécessité écologique et agronomique. Cahiers Agricoles, vol. 8, n° 6 p. 486-497. [Consulté le 09/05/2010].
- http://www.john-libbey-eurotext.fr/e-docs/00/04/29/CF/vers_alt/VersionPDF.pdf
- El Zerey Wael, Salah Eddine Bachir Bouiadjra, Mohamed Benslimane et Khalladi Mederbal**, « L'écosystème steppique face à la désertification : cas de la région d'El Bayadh, Algérie. », VertigO – la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 9 Numéro 2 | septembre 2009, mis en ligne le 26 octobre

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

2009, Consulté le 02 novembre 2011. URL : <http://vertigo.revues.org/8821> ; DOI : 10.4000/vertigo.8821

Emberger L., 1942. Un projet de classification des climats du point de vue phytogéographique. Bull Soc Hist Nat Toulouse ; 77 : 97-124.

Emberger L., 1955. Une classification biogéographique des climats. Trav Lab Bot Zool Fac Sci Serv Bot Montpellier; 7: 3-43.

Floret C., Galan M.J., Lefloch E., Orshan G. et Romane F., 1990. Growth forms and phenomorphology traits along environmental gradient: tools for studying vegetation, Journal of vegetation science 1: 71-80

Gounot M., 1969. Méthodes d'étude quantitative de la végétation, Edit. Masson et Cie., Paris:1-314

Guinochet M., 1973. Phytosociologie. Ed Masson et Cie, Paris. 227 p

Haddadou K., Benzadi S. 1993. Cartographie et mise en valeur d'Ima Hilma au 1/10000 (Parc national de CHEREA). Mémoire d'Ingénieur : Ecologie. Végétale. ISN. Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène (Alger, Algérie). 74 p.

Kadi Hanifi H., 2003. Diversité biologique et phytogéographique des formations à *Stipia tenacissima* L. de l'Algérie. Rev. Sécheresse 14 (3) : 169-179

Kadik L. et Godron M., 2004. Contribution à l'étude de la dégradation de la végétation dans les pineraies de *Pinus halepensis* Mill. d'Algérie et dans les formations dérivées. Bull. soc. Bot. 27 ; 9– 19.

- Khaldoun A.**, 1995. Les mutations récentes de la région steppique d'El Aricha. Réseau Parcours. p. 59– 54. La Steppe Algérienne, 1975. Centre Technique Forestier Tropical, Alger : 332 p
- Le-Houérou H.N.**, 1968. La désertification du Sahara septentrional et des steppes limitrophes. Ann. Alg. de géog., Alger n°6, p5-30
- Le-Houérou.**, 1971. Les bases écologiques de la production pastorale et fourragère en Algérie. F.A.O. Rome. 60p
- Le-Houérou HN., Claudin J., Pouget M.**, 1977. Étude bioclimatique des steppes algériennes avec une carte bioclimatique au 1/1 000 000. Bul Soc Hist Afri Nord : 36-40.
- Le-Houérou H.N.**, 1979. La désertification des régions arides, la recherche n°99, Avril, Vol.10, 336– 344.
- Le-Houérou H.N.**, 1980. L'impact de l'homme et de ses animaux sur la forêt méditerranéenne II (1-2) : 31-35 et 115-174.
- Le-Houérou H.N.** 1985. La régénération des steppes algériennes. Rapport de mission de consultation et d'évaluation. Alger : Ministère de l'agriculture. Alger, ronéotypé, 42 p.
- Le-Houérou H.N.**, 1988. La désertification du Sahara septentrional et des hautes plaines steppiques (Libye, Tunisie, Algérie). Amenag. Rura. V. 434 p.
- Le-Houérou H.N.**, 1995. Bioclimatologie et biogéographie des steppes arides du Nord de l'Afrique ; diversité biologique, développement durable et désertisation. Options édit., série B, 10, 1-396.

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

- Locatelli B.**, 2000. Pression démographique et construction du paysage rural des tropiques humides : l'exemple de Mananara (Madagascar). Engref. 442 p.
- Long, G.**, 1960. Les terrains de parcours de plaines, de plateaux et de basse montagne dans la région méditerranéenne. Fourrages, 4: 47-127.
- Lucas G.**, 1942. Description géologique et pétrographique des monts de Ghar Roubane et de Sidi El-Abed. Thèse Paris, Sér.A.n°1986, 540 p.
- Mazzoleni S., G. Di Pascale, O. Di Martino, F. Rego & Mulligan M. (eds).**, 2004. Recent dynamics of Mediterranean vegetation and landscape. John Wiley and Sons, London, 306 p.
- M'Hirit O. et Maghnouj M.**, 1994. Stratégie de conservation des ressources forestiers au Maroc. Les ressources phytogenetiques et développement durable :123-138. Actes éditions. Rabat, Maroc.
- Monjauze G., Faurel L. et Scotter G.**, 1955. Note préliminaire sur un itinéraire botanique dans la steppe et la sahara septentrional Algérois. Bull. soc. Hist Not. Afrique du Nord, Alger, 46, 206-230.
- Nahal I.**, 1984. Problèmes de désertification en région méditerranéenne. Départ des sci des sols. Inra Paris– Grignon, 14 : 71-103.
- Ozenda P.**, 1954. Observation sur la végétation d'une région semi-aride des hauts plateaux du Sud algérien pub. Soc. Hist Nat. Afr. Nord. 215 p.
- Ozenda P.**, 1977. La flore du Sahara. Paris. Ed. CNRS, 622 p.

- Quezel P, et Santa S.**, 1962. Nouvelle flore d'Algérie et des régions désertiques méridionales. Tome I. 460 p.
- Quezel P.**, 1964. Contribution à l'étude de l'endémisme chez les phanérogames sahariennes: 89-100.
- Quezel P.**, 1999. Les grandes structures de végétation en région méditerranéenne : facteurs déterminants dans leur mise en place post-glaciaire. *Geobios*, 32 :19-32.
- Quezel P.**, 2000. Réflexion sur l'évolution de la flore et de la végétation au Maghreb méditerranéen. Ibis Press. Paris, 117p.
- Quezel P., Barbero M., Benabid A., & Rivas-Martinez S.**, 1994. Le passage de la végétation saharienne sur le revers méridional du Haut-Atlas oriental (Maroc). *Phytocoenologia*, 22 : 537-582
- Raunkiaer C.**, 1934. The life forms of plants and statistical plant. Geography. Clarendon press Oxford, 7: 89-98.
- Seltzer P.**, 1946. Le climat de l'Algérie. Alger : Carbonel ; 219p.
- Skouri M.**, 1994. Les dégradations du milieu. Les mesures de protection. *CR. Acad. Agri. France*, 80(9) : 49-82. Paris.
- Stewart P.**, 1975. Un nouveau climagramme pour l'Algérie et son application au barrage vert. *Bull Soc Hist Afr Nord*; 65: 239– 345.
- Tatoni Th, Barbero M.**, 1990. Approche écologique des incendies en forêt Méditerranéenne. *Ecol. Med.* XII (3/4): 78-99.

Un écosystème steppique anthropisé (cas de la région d'El-Gor, Algérie, occidentale)

- Tomaselli R.**, 1976. La dégradation du maquis méditerranéen. Frêts et maquis méditerranéens— Notes tech. M.A.B.2, Unesco, Paris: 35-76
- Velez R.**, 1999. Protection contre les incendies de forêts : principes et méthodes d'action. CIHEAM, Zaragoza. Option Méditerranéennes, Series B: Etude et Recherches n°26. 118 p
- World Bank.**, 2002. World development report 2003: Sustainable development in a dynamic world: transforming institutions, growth, and quality of life. Oxford University Press: World Bank. 272 p.

Notas

1. Université ABB Tlemcen, BP 119, Imama, Tlemcen 13000 Algérie.
Bel_air@live.fr (Bensenane)
2. Université ABB Tlemcen, BP 119, Imama, Tlemcen 13000 Algérie.
Benabadji_m@yahoo.fr (Benabadji)